

醫學入門

四卷上

#1336609111

v. 9

編註醫學入門 四卷上

雜病提綱

外感

風

四寒

五

暑

七

濕

八

燥

九

火

內傷

十脾胃

十一

氣

十二

血

十三

痰

六鬱

十八積熱

十九

諸虛

二十

沉寒痼冷

雜病分類

風

十四

頭眩

十五

頭痛

十六

頭風

附眉稜骨痛

十七面風

十八眼

十九耳

二十鼻

二十一口舌唇

二十二牙齒

二十三痛風

二十四痺風

附麻木

二十五斑疹

附赤白遊風

寒

二十六咳嗽

二十七霍亂

二十八心痛

二十九腹痛

附腹中

暑

三十瘡

三十一痢

濕

三十二痞滿

三十三泄瀉

三十四吞酸

三十五黃疸

三十六水腫

三十七鼓脹

三十八赤白濁

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

平

編註醫學入門外集卷之四

丹溪朱先生雜病纂要

詳拾致餘論局方發揮丹溪心法纂要日用醫按及今附餘併各名

家方書如巢氏病源好生書
儒醫纂要惜乎未之見也

△雜病提綱

外感 風 寒 暑 濕 燥 火
內傷脾胃氣血 痰滯積熱諸虛痼冷

○外感

○風

頭眩 頭痛 面風 眼 耳 鼻
口舌 牙齒 痺風 瘰癧 遊風

中風卒倒分真似

風為百病長善行數變為卒中昏倒為
竅視暗僻為搐搦反張或為寒中或為

熱中或為癘風入陽經則狂入陰經則顛入皮膚則痒入
筋則癢急入骨節則疼痛入肉分與衛氣相搏則不仁與
榮氣相搏則半身不遂入經癱瘓入絡膚頑入腑即不識
人入臟即舌強吐沫挾熱則痿緩挾寒則拘攣挾濕則腫

滿有真中者有兼中似中者陽病身熱陰病身涼烏附行經不可驟用

初以反緩正氣反急牽引口眼喎僻或左或右急搗人中按頂髮灸耳垂珠粟米大艾三五壯外用南星草烏各一

兩白芨一錢姜蠶七枚為末姜汁調塗喎處正即洗去內用正苦藥白附子姜蠶全蝎等分為末酒調服二錢○不

語有數端有風中心脾者資壽解語湯有風中心經者小續命湯去桂附加菖蒲有痰塞心竅者導痰湯加菖蒲人

參竹茹或芩連有舌本強硬語言不正者用蝎稍二錢半茯苓一兩薄荷二兩為末酒調服二錢或擦牙尤妙又有

風熱壅者有血虛氣虛者有腎虛及老人忽言不出者十全大補湯去桂加菖蒲遠志痰塞喉中聲

噫噫同上卒倒歪斜不語各風癱身軟有汗者生汗不出身直者死痰由水化制火閉塞心竅不語熱者涼隔

散加黃連或牛黃清心丸虛者星散散二生飲導痰湯小省風湯半身或只一肢不遂此名偏

癱變智不亂病在膚四肢癱此名風痲智亂不能言者難治其症身體無痛緩則四肢不舉

急則一身皆仰或左癱右瘓或一臂不隨時復轉移一臂祛風化痰調氣養血為主換骨丹黑虎丹神仙飛步丹有脾實者膏粱之疾非肝腎虛痿搜風順氣丸有脾虛者十全大補湯獨活寄生湯萬寶回春湯又有五痺

類風狀見四症風癱風非全無莫浪猜中暑中寒中濕痰厥氣厥食厥熱厥

內傷兼中亦然但四症見一便作風治惟有輕重緩急之分輕者發過如故或口舌無恙足顫拽者大省風湯加

人參沒藥等分水煎熱服得活即愈或四肢無恙口啞語澀者古防風湯入麝一釐調服或自醒能言能食惟身體不遂者地仙丹西北高真中宜分治

東南濕兼中似審實虛主火間主氣或主濕內傷兼中似中盡相須二子所主雖殊而實同也况濕則中氣不運而生痰痰因火動而生風又兼二子之

見氣衰賊邪容易襲氣血壯盛腠理緻密邪不能入惟中氣衰賊邪容易襲氣血始衰腠理空疎加以七情勞

役飲食內傷元氣門巷賊風乘虛襲入臟腑血脉故有兼
中者東垣所謂非外邪徑傷乃本氣病也有醉後當風頭
面多汗善渴者名曰漏風宜黃芪六一湯加參木牡蠣乾
葛有房勞中風下體多汗曰內風十全大補湯加附子防
風如入風府曰腦風入係頭曰目風在腠理為洩風與漏
風同但身盡疼耳久則為腸風食後曰胃風又名夾食中
風久則為下血有傷食變為暴厥亦類中風但停食則胃
中滿悶須探吐及理脾胃有酒濕病亦類中風當分消以
瀉濕毒有內傷熱症似中風者有雜
病虛症似中風者均不可以風治
火動氣中無涎汚氣
脉沈身涼無痰涎為異耳如思慮肉脫憂愁肢廢悲哀筋
攣遲喜皮稿盛怒腰膝即河潤所謂將息失宜五志過極
則心火暴甚腎水難制熱氣拂鬱昏倒筋骨不用久則癱
瘓忌服風藥宜藿香正氣散合星香散虛者八味順氣散
實者四
真中中腑着四肢手足拘攣或中身前身後身側
七湯可治脉浮有表面見五色惡寒
宜小續命湯或排風湯風從汗散通因通用是也如脉浮
不語者用防風黃芪煎水一盞置床下薰入鼻中良久能

言進中臟閉塞九竅多昏危中臟之絡者口眼俱閉可治

眼閉脾絕手散肺絕痰如拽鋸肝時腎絕遺尿或大吐大

瀉下血吐血者皆死宜三化湯搜風順氣九麻子仁丸凡

攻裏忌腦腐牛黃引風入骨荒花甘遂損傷氣血如汗多

尿少者忌滲利榮竭無以制火煩熱愈甚候熱退汗止小

便利自中血脉也則歪口眼或近於腑外亦有六經形症則

從三化湯加減微利又有中經亦要知內無便溺外無

六經形症從中治不可汗下蓋風本於熱熱勝則風動宜養

羌活愈風湯如欲微汗愈風湯加麻黃欲微利愈風湯加

大黃中臟雖宜汗汗多則亡陽中臟雖宜下下多則亡陰

若臟腑兼見者或先汗而後利口不能言肢不持手足不

或表裏兼攻者防風通聖散乃血弱不能左為死血留滯與少血

管筋與舌也活主之瘀血加桃仁

紅痰與氣虛身右居

血虛則痰火流注於左而為癱氣虛則痰火流注於右而為瘓急治則愈

久則痰火鬱結難治痛者為實先以二陳省風之類治痰後以防風通聖散瀉青丸之類瀉火不痛為虛血虛者四

物湯俱姜汁炒過加竹瀝姜汁肥人濕痰少加附子行經瘦人火動加黃柏氣虛者四君子湯虛甚遺尿聲嘶睡者

濃煎參芪加附子姜汁勞傷者補中益氣湯加竹瀝兼治右瘓痰盛者二陳湯加姜汁竹瀝能食者換荆瀝此丹溪

雜病通治北開關化涎沫

開關散吹鼻有嚏可治無嚏者死牙關緊急入藥不得者

用南星五分龍腦一字端午日午時合每用一字至五分搽牙熱自開痰甚者宜量虛實吐之虛者稀涎散微微吐

出冷涎實者用瓜蒂炒黃末五分或一錢入全蝎末半分吹入鼻中立吐如不吐用酸薑汁調下如再不吐用熱薑

汁投之此藥不可輕用吐後宜服降火利氣安神定志之藥吐法見傷寒但中風大吐涎出久則手足骨節皆枯不

能轉動滑利以藥壓下再歸骨節可也小兒驚搐亦然

順氣活血風自祛

風症皆痰為患故治

以開關化痰為先急則祛風緩則順氣久則活血如真氣
漸復痰飲漸消或尚有風邪未退羌活愈風湯調之實者
川芎茶調散濕者萬寶回春湯未可全以風治也抑論舊
以西北風高真中宜分臟腑經絡調治東南地濕兼中似
中宜分氣血虛實痰火多少調治然真中兼中南北互有
且治臟腑者可不分氣血之虛實乎治氣血者又可不分
臟腑經絡之邪多少乎大抵外感重而內傷輕者先須分
表裏法祛風為主次用氣血痰法調治內傷重而外感輕
者先用調補氣血痰法為主次若覺層頑肌蠕動足麻木
分臟腑經絡祛風此活法也

肌肉蠕動如有虫行心神憤亂宜烏藥順氣散預防之法
如眉稜骨痛者風之兆也宜古防風湯加芥連

亦堪推藥風丹五參散史國公浸酒方卑蓀發九

胃風惡風多屬肺肺主皮毛通膀胱最易感冒新咳嗽惡
風鼻塞聲重噴嚏是也柴胡半夏湯參

蘇飲寒月麻黃杏仁飲重者頭疼身痛寒熱咽乾音啞柴
胡桂枝湯防風冲和湯頭痛甚者川芎茶調散痰多者金

沸草散挾熱入參敗毒散升麻葛根湯挾寒十神湯挾寒濕消風百解散挾濕神木散挾暑香葛湯時行柴胡升麻湯挾內慎勿專攻外服食過厚素有痰火非常鼻塞流涕聲重咳嗽畧被外感則甚都防風通

聖散或大黃黃芩等分爲丸白水下素臣者只用防風羌活川芎隨宜加入補藥痰藥中傷食加白朮陳皮青皮山查麥芽挾形寒飲冷加姜桂挾房勞加參朮歸地挾勞傷傷氣者補中益氣湯加羌活防風風虛甚者羌活九加味烏荆重則傳變輕不傳同傷寒治法久甚能爲氣血害能燥血散氣故古用桂附八物等湯久不愈者只宜二三日湯加減飲之切忌疎泄雖初起非寒月無汗麻黃禁用

寒

咳嗽
心脾痛
霍亂
腹痛

中寒無汗肢僵仆

傷寒循經漸入中寒不問冬夏或當風取涼或坐地受冷肅殺之氣自皮膚卒

入臟腑昏倒四肢拘攣強直厥冷與中風相似牙緊四肢不動爲異耳急用葱餅熨臍并灸氣海手足溫煖則生如

極冷唇青嘔逆無脈舌

急分三陰燮下元

急煎姜附理中

救之次審中脘疼痛中太陰者理中湯脉沉足冷中少陰

者四逆湯加吳萸或腎腹疼痛五積散加吳萸小腹疼痛

中厥陰者當歸四逆湯加吳萸或五味子如陰盛煩燥熱

藥冷飲或加些涼藥為引溫中散冷補後下元陽氣復而

寒自消矣切勿忌吐下方感冒尋常和表裏者多東南溫種

東補血者寒泣血故也中傷者少尋常感冒表症見者九味羌活湯芫芷香蘇散

寒入胃者霍亂轉筋瀉下利乾嘔吐逆霍者正氣散

或五積散挾食停痰者人參養胃湯夏秋暑寒折熱於裏

者調中湯微下之凡帶瀉遺精夜夢痛瘕脚氣腰膝冷屈

暑

入明卷四

五

暑熱汗渴審實虛

暑病身熱自汗口渴面垢而已餘症皆後傳變以兼內傷必先問其人素虛則

弱或大病大勞後縱暑中傷者宜清暑益氣素強盛壯實無虛損病者宜壯暑和中

陰陽經絡最要

拘靜居高堂大復得病似熱症屬心脾經者多中暑陰症

拘

動作田野道途得病似傷風症屬膀胱經者多中暑陽

症其實一也但夏暑氣重得日中暑夏被日逼而得日

中陽然暑初入白口鼻牙縫達乎心主脾經以火從火故

古法祛暑取冷水灌既勿灌入肝則收暈頭麻入脾則昏

睡不覺入肺則喘咳痰壅入腎則消渴非專心主而無傳

入中繫傷緩胃淺伏深分輕重

中暑歸心神昏卒倒傷暑肉分周身煩燥或加針刺

或有赤腫蓋天氣浮於地表故人氣亦浮於肌表也冒暑

入腸胃腹痛惡心嘔瀉伏暑即冒暑久而藏伏三焦腸胃

之間熱傷氣而不傷形自月莫覺變出寒熱不定霍亂吐

瀉膨脹中滿癰痢煩渴腹痛下血等症但暑病多無身痛

間有痛者或為濕

暑風暑瘧又何如

即暑暈症但以手足搐搦為風手足逆冷

浴水濕相搏可

為厥厥與傷寒熱厥義同黃連香茹散暑風乃勞役內動
五臟之火與外火交熾則金衰木旺生風香茹散如羌活
或六和湯合消風散素有痰飲因暑觸動痰熱生風者六
和湯合星香散若道途卒倒湯藥不便恐氣脫難治急扶
陰涼處不可卧濕冷地掬道上執土放臍上撥開作竅全
人尿於其中待求生姜或蒜嚼爛以熱湯或重便送下外
用布蘸熱湯熨氣海立醒後尤不可飲冷水以冰劑滋補
藥服之如心神恍惚用五苓散燐心同煎入硃砂末調服
有汗加黃芪因酒引暑入腹尿血者去桂加黃連或神昏
驚悸妄言用益元散量加硃砂新汲水調服二錢降胃火
治煩熱利濕

痰火絞腸俱可吐

暑毒痰火窒塞胃中量體
虛實吐之痰鬱發之之義

也如痰喘氣急痞塞入藥不得者急煎六和湯調腐二蠶
服○絞腸痧腹痛不可忍或連心氣轉在地手足亦有
冷者乃腸絞縮在腹須更急死急用熱湯調鹽一二兩灌入
即安或并陳艾陳樟木陳壁土各等分水煎連進三四
服刺血法

祛暑和中

利濕消

症自除

夏月人多飲冰食冷
故宜利濕祛以消導

汗多者忌之○桂枝湯加參朮寒熱不定小柴胡湯○和中大小調中湯如

虎湯加參朮寒熱不定小柴胡湯○和中大小調中湯如

苓湯批杷葉散胃苓湯

桂苓其靈散六一和湯

寒熱甚者須反治○伏陰在內之時

避暑貪涼外又

襲陰冷之氣當週周身陽氣宜辛溫解散如霍亂之類若

外既受寒內復傷冷加乾姜砂仁枳實若外觸暑氣內傷

冷食以致外熱內寒宜清暑益氣湯若外不受寒止是內

傷生冷腹痛嘔瀉宜理中湯加麥芽砂仁或木順散或二

氣丹冷水下丹丸皆治因暑傷冷其濕散治

暑之謂也誤服發黃發瘥蓄血悶亂而死

清癰○內傷勞役或素氣血虛弱病暑者一以滋補為主慎

倦者補中益氣湯或為丸中啣暫加香

茹薤豆二陳廬者滋陰降火湯腎氣丸

太熱傷氣養生家謂此時縱酒恣色令

入內腎虧爛至秋方凝甚則化水而死

預防不獨羨香茹

時常德暑體實者香茹散益元散虛者忌用蓋脾胃虛弱必因暑勞役及乘涼致病每遇春末夏初頭疼脚軟食少

體熱各注夏病宜補中益氣湯去升柴加黃柏芍藥五味子麥門冬有痰加半夏夏姜汁實三伏卻暑之聖藥也如氣衰清神不足煩渴懶食者生脉散誘行丸通用謝傳萬病無憂散

○濕 痞滿 脹滿

泄瀉

吞酸

黃疸

水腫

赤白濁 腰痛 痢痛 脚氣

濕氣歸來分內外

風寒暑暴傷人便覺濕氣薰襲人多不覺有自外入者長夏鬱熱山澤蒸氣冒

雨行濕汗流沾衣多腰脚腫痛有自內得者生冷酒麪滯脾生濕鬱熱多肚腹腫脹西北人多內濕東南人多外濕

內外又分上下中

濕在上宜微汗在中初入身沈重多困下宜利二便或升提

倦

或肢節痛或一身盡痛其則濕聚為痰昏不知人為首視為鄭聲

上薰喘咳

茯苓湯

日如

蒙

首位高氣清濕薰則如有物以蒙之也卑者木膏然

着脾

腫脹

硬退黃丸

太便

泄

木附湯三白湯

着腎脚腰小便濃

濕下先受之故腰脚攣痛獨者寄生湯當歸散

痛湯腎着湯青娥丸

治外微汗通經絡

微汗防已黃芪湯或羌活勝

通經絡神仙飛步

用乳香黑虎丹

治內微汗便利為妙土

漆劑五苓散黃

痛加羌活一倍濕盛膨脹者又當以車前木通等歷利水
行氣為君而以參朮茯苓為佐或以二朮為君而以利水
藥為佐濕鬱肢脹或遍身浮腫者皆自內
而出也量虛實利之不取利者退黃丸妙

四氣相兼

濕熱甚

除濕湯兼風合桂枝湯或古防風湯敗毒散兼寒
合五積散或古羌附湯兼暑合五苓散大抵百病

兼風則必惡風有汗眩暈兼寒則必惡寒無汗或癢痛兼
暑則必面垢煩渴兼濕則必腫滿沉倦四氣互相兼併惟

寒濕濕熱為病濕熱尤多尿赤有渴為濕熱多黑瘦膏
梁之人以便清不渴為寒濕多肥白淡食之人昔有專用

五積治寒濕防風通

清熱燥濕兼補中

此治濕熱法也凡

聖散治濕熱宜哉

食以致脾虧火動肺金受傷則木旺侵脾令飲食不化鬱
為痰積其則腹脹浮腫實者下之虛者補脾利濕消導兼

以清熱清濕湯是也濕勝筋痿熱勝筋縮者尤宜

通用 內外燥脾并升散 燥脾

安丸 卑蒼木丸 升陽除濕湯 通用 二陳湯或平胃散 加桑白皮為主 濕在上焦加羌活蒼木微汗 有熱加黃芩中焦濕加猪苓澤瀉滲利熱加黃連下焦濕加升麻防風升提熱加防己黃柏龍膽草肥人多濕加蒼木滑石瘦人多熱加蒼木流注加參朮又 實者大便秘可攻 元氣實而濕熱甚者導水丸或除濕丹 升車丸

燥 消渴 燥結

燥有內外獨陽明

外因時值陽明燥令冬晴不雨黃埃蔽空令人狂甚皮膚乾枯屑起內因七情

火磨或本病吐利亡津或金石燥血或房勞竭精或饑飽勞逆損胃或炙燔酒醬厚味皆能助火邪消燥血液

總來金被火相刑

六氣風熱火屬陽寒燥濕屬陰但燥雖屬秋陰而反同風熱火化蓋火盛則金

被熱傷木無以制而生風風勝濕熱耗津入肝則筋脉動
強緊急口禁發為風癰或手足痲痺偏枯或十指反而莫
能搔痒或為雀目内障入心則舌音僵仆語言蹇澁入脾
則膈滿不食或善饑而瘦或傷積結為水腫腹脹入肺則
毛焦乾疥癩鬱咳入腎則津液竭而煩渴及
骨蒸秘結總皆肺金所主陽明與肺為表裏也 欬勁渴秘

雖風熱表裏俱宜潤衛榮

表病皮膚皴揭四物湯去川芎
合生脉散加知柏天花粉或單

天門冬膏如筋脈不能運動者大秦芩湯○裏病消渴渴
血潤燥生津飲○燥結因肝木自旺或肺風入大腸者日
風燥其風順氣丸因臟腑積熱或久病鬱熱者日熱燥可
順清涼飲當歸龍薈丸因脾胃伏火便閉不食者日血燥
四物湯加大黃桃仁或為丸服大便偏熱者真帶通幽湯
小便偏秘者導氣除燥湯陰虛火燥者日虛燥單黃柏丸
補陰丸腎氣丸勞役氣虛燥者補中益氣湯通用四物湯
去芍為君天麥門冬為臣瓜蒌為佐升麻紅花甘草為使
風加秦芩或牛膝熱加黃芩血枯生地渴加天花粉五味
子閉結加大黃郁李仁麻仁氣虛量加參芪陰虛加知柏

大抵宜甘寒潤劑是辛香動火及一切發汗之藥經曰燥者潤之養血之謂也蓋燥則血凝而氣液為之凝滯潤則血旺而氣液為之宣通由內神茂而後外色澤矣然精液固能生氣積氣亦能生液常用氣虛者瓊玉膏津虛者卑五味子膏血虛者地黃膏凡病渴天燥亦宜量加此等潤劑

火

脇痛 夢遺 小便不禁

淋 脫肛

小便不通

火因內外分虛實

外因邪鬱經絡積熱臟腑此為有餘之火內因飲食情慾氣盛似火此為有餘

中不足陰虛火動乃不足之火太要以性暴無常主病多脈弦數無力為虛火實大有力為實火火病死人甚暴變化無常一動便傷元氣偏勝移害他經內經病機十九條而屬火者五劉河間推廣五運為病屬肝者諸風之火屬脾者諸濕痰火屬心肺者諸熱實火屬腎者諸虛之火散於各經浮遊之火入氣分無根之火入血分消陰伏火故曰諸實火渴閉熱無間實火內外皆病尋痰天痰火生熱症熱口渴日夜

潮熱太虛熱有間口無柯虛火潮熱有瀉實補虛升且降

實火因久感邪鬱在表者九味羌活湯半表裏小柴胡湯

入裏太承氣湯燥渴白虎湯因金石灸燔者黃連解毒湯

防風當歸飲三黃九太金花九狂者黑散九○犀火氣虛

火盛因勞倦傷胃無力身熱宜保元湯補中益氣湯加芍

藥黃柏或四君子湯參之如大病及吐瀉後身熱如焚命

門脈脫為陽衰之病宜以辛熱溫養其心則熱自退附子

理中湯霍亂散主之○血虛火動因傷色慾午後發熱宜

四物湯滋陰降火湯加味逍遙散散腎氣丸入中白散若腎

水受傷生地玄參煎膏主之相火旺甚氣從臍下起者止

氣湯坎離丸如氣從湧泉穴起入腹者厘極難治四物湯

加白馬脛骨降陰火以代茶連或人中黃亦好外用附子

末津調塗足心亦有濕熱鬱者○飲食鬱火因內傷生冷

及飲食不化抑遏陽氣於脾土四肢熱如燼以升散之劑

發之升陽散火湯火鬱湯消陰火升陽湯○七情五志火

起宜隨各証調之太怒火起於肝則手掉目眩清肝湯加
龍草古朱連九瞢飽火起於胃則痞塞腫滿瀉黃散戊

九單石黃丸悲哀火起於肺則氣逆胃鬱白散加黃
芩葶藶單黃芩九單苦參九房勞火起於腎則骨蒸潮熱
大補陰丸滋腎丸單黃柏丸心火輕則煩熱痛痒單得心
火重則自焚面青發躁脉絕暴死故曰五志之火動極不
治總論虛火可補實火可瀉輕者可降重者從其性而
治之久久正治可以濕伏可以水滅可以直折相火反治
不可以水濕折惟從其性而伏之即如實火發狂宜三黃
湯止治虛火發狂先與姜湯然後補陰其火自降凡火
虛不可猛用涼藥必酒炒過或兼溫散
甘緩又有可發汗者風寒生冷鬱也

君相民皆靜且和

內傷

五行惟火有二心為君火一身之主腎為相火遊行於身
常寄肝膽胞絡三焦之間又膀胱為民火亦屬於腎此皆
天賦不可無者若五志之火則由於人是以前傷火多外
感火少意火不妄動動由於心靜之一字其心中之水乎

調理脾胃

傷食
痞塊

積聚
蠱瘴

調理脾胃濕與熱

脾性濕土乎血陰也胃火化主乎陽也太濕則氣滯太乾則血燥濕熱則

則能食能化而氣血生旺苟或寒濕傷脾則停飲難化或不思食燥熱在胃則停食不消或善食而瘦由是脾胃不

和交相為病胃變為寒脾變為熱太繁以脉浮緩而遲或

為寒為濕脉浮緩而實或細而數為燥熱又肥人多濕

瘦人多熱更參以且按心口疼不疼勞傷手按心口不

飲食厚薄可也且按心口疼不疼食傷手按心口刺痛

食傷初寒久則熱勞倦初熱久寒生

勞倦傷初起熱中宜甘溫補中久變寒中

宜辛熱溫中飲食傷初起寒濕宜辛燥消導久為濕熱宜辛甘苦寒潤之

熱病多火痰暈吐

足

痿或大濕病腫脹瀉難停消補清熱與燥濕

勞傷元氣不足宜補

益食傷邪氣有餘宜消導勞役飲食俱傷補益消導兼行其中或兼清熱或兼燥濕痰○補劑補中益氣湯主之消

導停食枳梗二陳湯加山查麥芽枳朮丸停飲胃苓湯加

二化痰丸○清熱小調中湯橘皮竹茹湯疑神散三黃

枳朮丸保和丸○燥濕二陳湯六

君子湯理中湯生胃丹單蒼朮膏

乘勝虛實脉堪憑

脾胃

臟主風寒暑濕燥一氣偏勝亦能損傷假如脉弦風邪所

勝胃風湯黃芪建中湯三白湯脉洪熱邪所乘瀉黃散清

胃散調胃承氣湯脉瀉燥邪所乘八珍湯錢氏白朮散脉

沉細寒邪所乘益黃散人參養胃湯九附子理中湯九補

真丸脉緩濡無力或時隱伏正氣虛而損也四君

子湯參苓白朮散脉緩太過濕邪自甚也平胃散

氣

氣滯

氣刺痛

諸氣皆因火作孽

七氣喜怒憂思悲恐驚又曰九氣者挾外感寒熱而言也人身陰陽正氣呼吸

升降流行榮衛生養臟腑惟七情火火傷肺則塞清道以

致上焦不納中焦不運下焦不滲氣濁火盛薰蒸津液成

痰痰鬱成積初起宜四七湯七氣湯辛溫消散稍久宜二

陳湯加麥連山施或當歸龍薈丸木香檳榔丸辛涼以折

之最忌辛香助火耗氣之劑雖木香亦好上升必佐以知

母黃柏丹溪云上升之氣自肝而出中挾相火其熱為甚

白覺其冷
非其冷也
問傷生冷與寒熱
挾傷飲食生冷嘔逆積痛者

香脾積丸或七情後過飽大實痛者煮黃九因七情過饑
胃脘痛者四君子湯加木香○挾寒則腰理密而氣斂於

中五積散入裏四逆湯挾風分心氣飲挾風寒犯肌者活

附子湯挾寒濕五苓散五苓能升降諸氣通利三焦非特

分利而已凡此熱劑明知口滿冷物身受寒氣而後敢用

亦變法也高陽生專謂冷生氣者泥矣○挾暑熱則腰理

開而汗泄於外黃連香茹散加喜樂恐驚嚇勞動散其

夢根或清暑益氣湯加木香○喜樂恐驚嚇勞動散其

元喜動心氣散不敷過則健忘歸脾湯恐傷腎精快不升

過則下焦脹滿二和散補中益氣湯驚傷膽神亂不定

過則怔忡失志妙香散十味溫膽湯此三者皆令其元耗

散多見不足之症又勞則喘息汗出亦令氣散尤宜補益

怒傷肝氣上逆過則嘔吐

憂愁悲哀思慮滯結枳梗二陳湯絳珠正氣天

香湯熱者柴陳湯憂傷肺其氣聚過則喘促蘇子降氣湯

分氣紫蘇飲嘔膈者常用五兩案中散悲傷心抱及肺

其氣急過則為狂者枳實煮散升陽順氣湯思修用其氣
結過則痞滿退熱清氣湯溫膽湯木香化滯湯木香枳木
九此四者皆令邪氣鬱結多見有餘之症又過則
氣滯亦令氣結輕者行動即愈重者橘皮一物湯結為積

聚散虛中

氣結為五積六聚癥瘕疝氣太實痛等疾暫用
益前散阿魏撞氣丸木香分氣丸太黃備急丸

○氣散則中虛倦怠無力短氣不足以息宜調中益氣湯
人參養榮湯自汗喘急者養正丹俗云氣無補法不思氣
虛不運邪着為病不補氣何由行且如喘嗽氣鳴以枳梗
姜橘蘇桂調其氣以星半細辛豁其痰而終不下降者氣
之所藏無以收也必佐以補骨脂補腎則
氣始元經曰結者行之散者益之是也走注眩暈吞酸

壹

無積者濁氣入榮衛則攻刺肩背四肢有積者濁氣
滯胃腹脹胃脇肋着於一處則眩暈嘔吐吞酸噎膈痞

痺泄瀉心腹絞痛流氣飲子主之或木香勻氣
散施姜飲古黃連丸施更丸清膈蒼莎丸選用胃痞痺腫

二便秘

胃膈痞塞枳梗湯胃痺氣塞枳橘湯浮腫木香流
氣飲太便秘三和散四磨湯秘傳降氣湯燥者麻

子仁丸熟者小承氣湯如壯盛人氣閉胃滿
百藥不効者五香連翹湯小使閉者五苓散
禁血兼痰宜

審別血凝則氣亦滯四物湯加香附側柏葉
禁痰血加地

蘇子降氣湯甚者治分痰積少與多降火清心尤妙訣不

稀涎散微微吐之

內傷外感久皆鬱熱滯為痰積亢七情之火無日不起五

味之偏無日不積此冊溪河間力主為火也雖然七情總

發於一心七氣總謀於一氣氣陽也動則為火故以降火

化痰消積分治量其所稟厚薄而加裁之大槩氣虛因君

子易氣實古烏附湯為主火多合黃連解毒湯加知母枳

壳痰多合二陳湯積多合平胃散痛加玄胡索青皮莪朮

寒加官桂吳萸更便閉加木香檳榔男

子血虛及婦人胎產氣疾合四物湯

血吐血

嘔血

衄血

咳唾咯

腸風臟毒

諸血先須分各經逆則上行順下行血乃水穀之精變成

生化於脾土息於心

藏於肝布於肺施於腎脉絡臟腑耳自手足資為運用然
陰道易虧一有感傷調理失宜以致陽盛陰虛錯經妄行
火載則上升按經則下行是以上溢清道從鼻而出為衄
留滯濁道從胃脘而出為嘔嘔滲入腸間從下部而出為
血痢結於腸胃則成積而為血瘕分經言之嘔吐胃也咳
唾衄肺也痰帶血脾也咯血系腎也溺血小腸膀胱也下
血大腸也牙宣胃或腎虛炎也又血從汗孔出者謂之肌
衄從者謂之舌衄心與肝也從委中穴出者謂之腠
血腎與膀胱也大禁
逆符難治順符易治
然瘀血亦能作潮日輕夜重者血為
陰也如九竅出血身熱不卧者即外
氣行氣行則行氣止則止氣溫則滑氣寒則凝故涼血必
先清氣知血出某經即用某經清氣之藥氣涼則血自歸
隊若有瘀血凝滯又當先去瘀而後調氣則其血立止或
元氣本虛又因生冷勞役損胃失血者却宜溫補斂而降
之切忌清涼反致傳
瘀胃膈不散量
外感積瘀宜涼
血散劑外感四氣邪
火之劑傳經絡諸汗

誤下以致邪逼經血妄行風症色青多鼻衄者金沸草散
去麻黃加桔梗枇杷葉桑白皮或參蘇飲加黃芩○寒症
色黯鼻衄點滴者九味羌活湯麻黃升麻湯○暑熱逼血
色紅甚則黑者茅花煎湯調五苓散暑毒攻心嘔血者杜
把葉散去丁香加黃連○濕症色如烟塵多下血者犀角
湯當歸和血散○時毒身熱吐膿者陽毒升麻湯○積熱
因飲酒炙煨蓄熱三焦者黃連解毒湯黃連枳殼二味湯
龍腦雞蘇丸○生九太金花九槐角丸○瘀血因打撲損
傷瘀聚胃膈者犀角
地黃湯桃仁承氣湯
內傷滋陰補火自平
內傷七情暴喜
暴怒傷肝不能藏血積憂傷肺過思傷脾失志傷腎皆能
動血治宜開痰行氣二陳湯加酒紅花升麻扁身黃連
者加參朮及附子一片熱者加山梔牡丹皮茜草生地木
香氣急者加瓜蒌仁桔梗勞心無汗者茯苓補心湯有汗
者歸脾湯素鬱者清肝解鬱湯氣壅者蘇子降氣湯失
血後被七情四物湯加木香檀榔陰虛者去木香加玄參
黃柏枳殼○內傷飲食生冷滯胃清道氣濁血亂者理中
湯加乾薑川芎治衄能分陰陽定血脈冷暈倒者加桂附

傷酒吐血者四君子湯加乾葛川芎山柰。內傷勞役氣衰火盛者單人參湯或四君子湯加蒲黃人乳藕節傷力吐血者豬肝蘇白豆末食或花蕊石散內傷氣散汗出汚衣甚如還染者黃芪建中湯妙香散或男胎髮燒灰膏之。胎血十全大補湯。內傷思慮色慾血衰火燥者。吁嗟男滋陰降火湯加味逍遙散節齋四物湯腎氣丸。

女血為疾 人知百病生於氣而不知血為百病之胎也凡寒熱踈攣痺痛癰疹搔痒好忘好狂驚惕迷悶

痞塊疼痛癰閉遺溺等症及婦人經閉崩中帶下皆血病也通用四物湯京血心加黃連小腸山梔仁木通肺加枯茶大腸實茶肝加條芩膽加黃連腎膀胱加黃柏脾加生地胃加太黃三焦地骨皮心胞絡加升皮清氣心與胞絡加麥門冬肺加枳壳肝加青皮柴胡脾加白芍胃加石羔乾葛大腸三焦加連翹小腸赤茯苓膀胱滑石琥珀瘀血加紅花桃仁韭汁童便以行之血來暴者加薄荷玄參以散之血不止者加蒲黃京墨茅根久不止者加升麻引血歸經血止後加炒黑乾姜引血保全脾胃可長生。血病每還元血虛加龜板血燥加人乳。

叔功胃氣一復其血自止他如嘔吐後發熱及傷寒汗下後發熱但用調和胃氣自然熱退可見脾胃能統氣血

痰喘噎

噎噤

惡心

嘔吐

飽逆

驚悸怔忡健忘咽喉

痰分新久內外邪痰乃津血所成隨氣升降氣血調和則

輕者形色青白稀薄氣味亦淡久而重者黃濁稠粘凝結咯之難出漸成惡味酸辣腥燥鹹苦但痰症初起頭痛發

熱類外感表症久則潮咳夜重類內傷陰火又痰飲流注肢節疼痛類風症但痰症曾滿食裁肌色如故脉滑不

不定為遊溢諸經主病除人多知氣血為病而不知痰病尤異耳多生於脾多因肢倦怠或腹痛

腫脹壯瀉名曰濕痰若挾食積瘀血遂成窠囊痞塊又名食痰留於胃脘多嘔吐吞酸嘈雜上衝頭面烘熱名曰火

痰若因飲酒乾嘔噎膈又各酒痰升於肺多毛焦面白如枯骨咽乾口燥咳嗽喘促名曰燥痰又為若痰鬱痰

又士情痰帶咽膈多曾脇痞滿名曰氣痰迷於心多怔忡
驚狂夢寐奇怪名曰熱痰動於肝多眩暈頭風眼目瞶動
昏澁耳輪搔痒脇肋脹痛左癱右瘓麻木蹣跚奇症名曰
風痰聚於腎多足膝酸軟腰背強痛肢節冷痺骨痛各日
寒痰又各虛痰凡渾身習習如虫行或身中結核不紅不
腫或頸項結核似癰非癰或走馬喉痺或胃腹間如有二
氣交約噎塞煩悶或背脊中常有一點如冰冷痛或心下水
公時痛或四肢腫硬似痛非痛或骨節刺痛無常處或吐
涎綠水黑汁或大小便膿或關格不通以至癆瘵荏苒
婦人經閉小兒驚搐皆須先去敗痰然後調理他如闔家
骨節撲傷刺痛不止散血之劑罔功續以白已
小便飲之須更吐痰去痛立止百病兼痰如此

風皆寒黑

濕色白

風痰外感賊邪或腎枯水動或內風鬱熱色青而
光風虛三生飲古龍虎丹風熱小省風湯搜風化

痰丸四神丹竹瀝膏○寒痰因形寒飲冷色深青黑如灰
善喘或喘輕者五積散藿香正氣散重者溫中化痰丸古
半硫丸○濕痰或外感濕滯或停飲不散色白喘急者千
續湯心痛者半生夏丸或神木丸濕熱色黃者中和丸清

隔蒼沙丸在重

者青蒙石丸

熱黃甚則帶紅些

熱痰因厚味積熱或外感誤溫所致色黃甚則

帶血或此紫清氣化痰丸

煎服太金花丸滾痰丸

火鬱稠粘氣如絮

火痰因飲食衣

液成痰稠濁

二陳湯加苓連山梔或抑上丸潤下丸

○鬱

痰即火痰鬱於心肺之久者疑滯胃膈稠粘難咯忌南星

半夏燥藥宜開鬱降火清金潤肺緩以治之節痰化痰丸

謝傳清金丸單貝母丸霞天膏

○氣痰七情鬱成略之不

出黠之不下形如破絮或如梅核四七湯又者

換蘇子加黃芩山梔海石三仙丸千金指迷丸

食痞酒臂

脇痛加

食痰因飲食不化結成痞塊橘半枳木丸痰壅喘

傷水心中堅大

枳者名氣分枳木丸將煎服痰癖硬

杯時有水聲者神保丸

○酒痰小調中湯香附以薑青黛

痰飲有五因只一汗吐下溫用其法

痰伏胞絡自肺竅嗽出涎伏脾元自

口角流出

飲生胃府從食脘吐出五飲六症留飲伏飲

為一也皆因

飲水及茶酒傳蓄不散再加以邪生冷七情

相搏成瘰，即酒瘰，久而濕勝者，與傷寒水症大同。脉多弦滑，或伏，眼下皮如灰黑。○瘰飲水，停腸胃，腹響轉，有聲。令人暴肥，暴瘦，懸飲，水流在脇，咳喘則痛，懸懸思水，溢飲，水流四肢，身體重痛，支飲，水停膈上，飽逆倚息，短氣，留飲，水停心下，背冷，如手掌大，或短氣而渴，四肢歷節疼痛，脇痛，引缺盆，咳，或轉甚，伏飲，水停膈，滿嘔吐，喘咳，發熱惡寒，腰痛，痛淚出，或身惕，胸中景治諸飲，在皮裏膜外，表分者，大小青龍湯，汗之，在胃膈者，瓜蒂散吐之，在四肢經絡，脇肋者，五苓散，分利之，在腸胃裏分者，十棗湯下之，此皆逆標之霸道也。從軀汗，必參蘇飲吐，以二陳湯加防風，桔梗，探之分利，五飲皆下劑，開結，枳朮丸，中間間以小半夏湯，古亭棗朮丸，溫中化瘰，九清氣化瘰，九半夏溫肺湯，隨虛實加減。

常法順氣與分導

古法順氣為先，分導次之。然氣升為火，因氣動者，曰

瘰氣順氣，瘰瘰湯，因火動者，曰瘰火，清熱，瘰瘰湯，因濕動者，曰濕瘰，瘰瘰湯，主之。通用二陳湯，能使大便潤而小便便長，充為分導。○藥風加南星，皂角，白附子，竹瀝，寒倍半夏，加姜附姜汁，火加石羔青黛，濕加蒼朮，白朮，燥加瓜蒌，杏。

仁老肺痰加海石芒硝水薑食積加山查神麴荻芽傳水
加橘枳痰在脇下加白芥子以行之痰在四肢加竹瀝痰
在經絡用此探吐痰在皮裏膜外
加白芥子竹瀝薑汁氣實用荆瀝墜下溫中潤肺家於腎
動於脾客於肺水升火降脾胃調和痰從何生○陽虛腎
寒不能收攝邪水冷痰溢上或昏暈夜喘上氣者八味丸
三味安腎丸黑錫丹以製墜之如痰壅發厥者蘇子降氣
湯三生飲古硫汞丹○脾虛不能運化者宜補中燥濕六
君子湯加竹瀝薑汁勞役傷脾失升降者補中益氣湯加
半夏竹瀝薑汁○氣血虧乏之痰客中焦閉塞清道者仍宜
溫中燥脾二陳湯氣虛合四君子湯血虛合四物湯○陰
虛腎火炎上肺燥者二陳湯合四物湯去川芎半夏加貝
母麥門冬瓜蒌仁桔梗潤而降之或腎氣丸三上腎氣丸
語云痰無補法且老痰凝滯膠固非暫用溫藥引導必有
拒格之患風寒痰氣內鬱不用溫散亦何以開結導此皆
難於無補也凡痰喘聲高脉數汗出如油身冰冷者死

○

與氣類參看寒鬱如心脾腹痛火鬱如脇痛
紫撲癰疽瘡癤濕鬱如腰脚痠痛分見各類

六鬱仍分痰火積

鬱者病結不散也六鬱氣血痰食濕熱

痰痰鬱則血不行

血鬱則食不消而成癥痞六者皆相因

為病以致當升降

不得升降當變化不得變化故法以順

氣為先降火化痰消積

分多少治與諸氣大同凡病

當先尋六鬱與痰火

有則急治於此無則依難症治久則

升散三焦通

鬱本病久不解因服藥雜亂而成又有鬱久

芳開提其氣以升之

如食在胃上提其氣則食亦自消痰

鬱火邪在下二便下利者

二陳湯加升麻柴胡小芍防風

以升發之熱鬱升陽散火湯

火鬱火鬱湯主之當

看發在何經加各經

火鬱又五鬱治法見第七卷

胃血能食

丹溪治病氣用四君子湯血用四物湯痰用二

氣鬱胃滿胸膈痛

流瀉加木香檳榔烏藥蒼朮小芍倍香

附砂仁痰鬱胃滿動

則喘急起卧忘情寸脉沉滑加南星

香附瓜蒌仁海石

血鬱四肢無力能食小便

淋大便紅脉沉芤

瀉加桃仁韭汁牡丹皮

食脹濕痛熱

目蒙

二陳湯為主食鬱噎酸惡食黃直鼓腹痞塊氣口緊盛加山查神效麥芽傷冷食胃脘痛加草豆乾姜芩

鬱週身關節走痛首如物蒙足重亦然渴陰寒便發脉沉

濡加白朮倍蒼朮熱鬱目蒙口乾舌燥小便淋瀝濁脉沉

加黃連倍山梔連翹六鬱不言風寒者風寒鬱則為熱

故也但諸鬱挾風加防風苦參挾寒加吳茱萸香附紫蘇脫

營愚者眠食廢

先順後逆雖不主邪病從內生令人飲食無味神倦肌瘦名曰脫營內服交感丹外

用香鹽散臨卧擦牙有鬱結在脛半年不食或午後發熱

酉戌時起或煩悶作渴加嘔或困卧如癡向裏坐亦喜向

壁處婦人經水極少男子小便頻數皆憂思氣結諸症溫

膽湯或二陳湯加參朮紅花痰火甚者以痰藥吐之

後用越婢有志養陰神自充

平人上納下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名利之士

九調理

有志養陰神自充

平人上納下化水穀滋沛身中陰氣自生如失名利之士

有志恆圖過於勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脫

不通而胃熱熱薰胃中則內熱宜養陰降火二白湯加蒙

皮蒼朮川芎山梔香附枳殼身草煎熟入姜汁少許熱服

以散其鬱加當歸黃柏沙參或玄參以養其陰痰加貝母

夏加麥門冬冬加補骨脂蓋當歸隨參補血白芍隨二木
除鬱因食冷物鬱過陽氣於脾土中多因血虛而得之故
用炒黑山梔解五臟結益少陰血
若不早治復恣酒色癆瘵之由也

積熱

積熱三焦實虛口乾煩渴大便

實熱因日服金石灸
燔夜卧熱炕或火煥

衣被久則積熱毒在土焦則咽乾口燥而鼻舌燥唇瘡
在中焦則胃滿乾嘔作渴在臟腑則大小便閉法當清心
解毒上熱赤痢散中熱調胃承氣湯下熱八正散三焦俱
熱三黃湯太金花丸○虛熱因消燦腎水相火炎上口燥

煩渴精神短少心悸自汗懶於動作夜卧睡語法
當降火滋水三補丸主之或只清之潤之而已

實分氣

血清各經

血分實熱白虎湯或敗毒散加荊芥青皮白木
血分實熱四順清涼飲氣血俱實熱洗心散甘

露散澤瀉湯○心熱單瀉心湯肝熱瀉青丸脾熱瀉黃散
肺熱瀉白散腎熱滋腎丸小腸熱導赤散胃熱瀉胃湯大

腸熱瀉白湯腸熱加柴石羔湯然諸熱皆屬虛炎升降於心熱其則能傷陰宜殊妙安神丸以清鎮之

與滋益氣分虛熱清心蓮子飲甚者龍腦鷄蘇丸久者宜升陽以散之小柴胡湯合四君子湯升陽益胃湯

清中益氣湯或疑補中益氣何以治熱孰不知熱因熱用溫能除熱之理蓋大熱在上大寒必伏於內溫能退寒以助地氣地氣者在人乃胃之生氣使真氣旺而邪熱自退

○血分虛熱四物湯加麥連山茱或為丸服久則滋陰以降之秦艽扶蘇湯或古歸氏湯滋陰降火湯蒸熱者加柴

前湯散故離丸○氣血俱虛熱升陽滋陰兼用十全大補湯人參養榮湯俱加知母黃柏然虛熱久必脾胃不和三白湯參苓白朮散調之

風痰濕熱常相

兼變症多端難執一風熱風其生熱者兼治風熱或熱甚生風者治其熱而風自消凡頭目腫

痛眩暈眼目赤耳聾耳塞口燥舌乾牙宣牙疳疳疹之類皆風熱炎上之所為也初起上攻者用芎藭茶調散至實

丹四神丹上清丸久而下注血衰者腎氣丸加知母黃柏或當歸龍薈丸四生散○痰熱者因痰生熱或因熱生痰

凡咽痛喉閉膈壅胃痞轉在驚悸怔忡健忘之類皆痰火
滯中之所為也小調中湯大調中湯○濕熱若因濕生熱
或因熱生濕凡泄瀉下痢水腫鼓脹黃疸遺精白濁疝痛
腰痛脚氣之類皆濕熱下流之所為也治見各條丹溪治
濕熱上焦黃芩虛者天麥門冬代之中焦黃連虛者白朮
茯苓葛根代之下焦草龍膽防己黃柏虛者肥人蒼朮南
星滑石瘦人牛膝續斷桃仁紅花經曰治病必
求其本此風熱痰熱濕熱乃百病之根本也

諸虛

發熱

惡寒

自汗

盜汗

痿

諸虛專要辨陰陽

血陰而氣陽也有暴虛而無傷損者易
復有虛而虧損者亦可補益惟久虛而

傷壞者必保養僅可半愈大槩虛脈多弦弦濡大而無力
者為氣虛脈沉微無力為氣虛甚脈弦而微為血虛脈瀄

而微為血虛甚或寸微尺大而緊者血虛有火多汗
又形肥而面浮白者陽虛形瘦而面蒼黑者陰虛

神昏精不藏腰背骨痛潮汗痰嗽是其常也此虛也

一、二、
便是外因新損容易復外因感寒久則損陽自上而下可

血脈虛少不榮臟腑婦人月水不通三損於胃則飲食不

為肌膚治宜辛甘若淡過於胃則不可治矣感熱久則損

陰自下而上二損於腎則骨痿不能起於床者死二損於

肝則筋緩不能自收持三損於脾則飲食不能消煎治宜

酸苦若鹹過於脾則不可治矣又不內外因驚而奪精汗

出於心則損脈疾走恐懼汗出於肝則損筋搖體勞苦汗

出於脾則損肉飲食飽甚汗出於胃則損陽持重遠行汗

出於腎則損骨治宜酸苦若辛散於心則不可治矣抑論

心肺損而色憊汗多者為陽虛肝腎損而形痿汗多者為

陰虛經云損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾

者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其

精是以古方肺損症見四君子湯心損症見四物湯心肺

俱損者八物湯心脾及脾胃俱損者十全大補湯肝腎俱

損者牛膝丸雜症執虛妄遺者桂枝湯加龍骨牡蠣四肢

煩熱酸疼心悸腹痛者小建中湯汗多力少筋骨拘急者

黃芪建中湯汗多脈暴結者灸其草湯暴損氣虛有汗朝

熱者補中益氣湯氣虛無汗潮熱者人參清肌散暴損血
虛有汗潮熱者人參養榮湯血虛無汗潮熱者茯苓補心
湯暴脫血者益胃升陽湯潮汗痰嗽者黃芪益損湯加
半夏大病後食減盜汗者參苓白朮散加黃芪當歸勞

慾久虛成內傷

內因五勞六極七傷積虛成損積損成傷

即六慾應六腑蓋心勞曲運神機則血脉虛而面無色驚悸
夢遺盜汗極則心痛咽腫肝勞盡力謀慮則筋骨拘攣
極則頭目昏眩脾勞意外過思則脹滿少食極則吐瀉肉
削四肢倦怠關節有背強痛肺勞武事而憂則氣乏心腹
冷胃背痛極則毛焦津枯咳嗽開熱腎勞矜持志節則腰
骨痛遺精白濁極則面垢脊痛此五勞應乎五極者也若
原因腑虛以致臟虛臟腑俱虛視聽已衰行步不正名曰
精極令人精竭莖弱核小故又曰六極極即傷也七傷者
推原勞極之由久視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨
久行傷肝房勞思慮傷心腎則陰虛血虛勞役饑飽傷胃
則陽氣虛此傷症之至要也○陰虛四物湯二宜丸腎氣
丸火動外潮者四物湯加知母黃柏或滋陰降火湯丸加

味逍遙散補陰丸火燥甚者大補陰丸單天門冬膏○陽

虛凡君子湯保元湯火衰中寒身冷者非茸大補丸後養

散加或肉因丸三仙丹溫腎丸肺補天左瑛龍丸○陰

陽俱虛八物湯固真飲子或丸人參養榮湯或十全大補

湯加燕蓉附子半夏麥門冬或八味丸有火者二至丸異

類有情丸○心虛人參固本丸藥授天王補心丹朱子讀

書丸肝虛天麻丸鹿茸四片丸脾虛參苓白朮散橘皮煎

丸蒼朮骨白朮膏參苓造化糕太和養肺虛里人參膏羊

五味子膏腎虛小兒絲子丸玄調和心腎養脾胃不論陰

免固本丸三味安腎丸太極丸調和心腎養脾胃陽損傷

皆因水火不濟火降則血脈和暢水升則精神充滿或心

腎俱虛或心脾俱虛或心肝俱虛或肺腎俱虛或五臟俱

虛但以調和心腎為主兼補脾胃則飲食進而精神氣血

自生○調和心腎虛中有熱者古養心腎丸虛中有寒者

究源心腎丸不受峻補者歸茸丸瑞蓮丸冷補丸挾熱

兼補脾胃二神交濟丹還少丹不真丸返本丸挾熱

氣細酌量虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正氣虛

邪氣實也心勞邪熱則口舌生瘡語澀肌瘦肝

氣細酌量虛者下虛也熱者上熱也又言虛實者正氣虛

邪氣實也心勞邪熱則口舌生瘡語澀肌瘦肝

勞邪熱則脇痛關格不通脾勞邪熱則氣急肌痺多汗肺
勞邪熱則氣喘面腫口燥咽乾腎勞邪熱則尿赤陰瘡耳
鳴弱閉三白湯主之心熱加黃連木通麥門冬生地肝熱
加黃芩防風當歸龍膽草赤芍脾熱加山梔石斛升麻肺
熱加知母桑白皮秦艽葶藶熱加玄參赤茯苓車前子生
地更參積熱則虛炎治法○挾氣者交感丹古菴云心腎
主血心惡熱而腎惡燥則清熱潤燥之藥是補心腎而瀉
肺脾也肺脾主氣肺惡寒而脾惡濕則溫寒燥濕之藥是
補肺脾而瀉心腎也局方蘇用辛香燥劑以能健脾進食
然陰血消而心腎損以致虛極火炎面紅盜汗痰多身熱
如次跌腫瘡泄肺緊不食者死噫凡虛
皆陰血陰氣虛也若其陽虛亦不可治
只是中和効更長
經云形不足者溫之以氣溫存以養使
氣自充非溫藥峻補之謂也精不足者
補之以味乃天地自然之味非膏粱之謂也今人無病貪
補而致病者有之有病貪補而不依症用藥反增痰火者
有之非惟不足卻疾延年亦非養心養性之道且少年慾
火正熾尤宜戒補中年以後必資藥餌扶持者亦須量體

寧從緩治不可責效目前反致奇疾大醫家虛者瓊玉膏
還元秋石九延年益壽不老丹耳目衰者還元丹四聖不
老丹松栢實九腎虛無火者何首烏丸鄧老烏鬚健陽丹
腎虛有火者八仙添壽丹麝香者大造九紫河車丹血疾
者女貞丹栢葉煎栢脂丸科金丹風疾胃火者松脂丸松
梅丸風疾無火者仙入散痰火躍盛者茯苓煎氣弱者單
人參膏血燥者單天門冬膏地黃膏脾虛者白朮膏脾腎
俱虛者加味蒼朮膏此皆養性延年之藥亦必因病選用

沉寒痼冷

沈痼大補

血氣煖脾胃

人身真陽耗散脾胃虛弱加以食飲
生以嗜慾過度以致臟腑停寒不發

謂之沈寒積冷不解謂之痼冷宜十全大補湯鹿茸大補
湯加姜桂雄附以滋氣血補下元若原只因生冷傷脾
者四桂散附子理中湯補其元氣補脾胃可也又有陰虛
內熱因傷冷藥及將息失宜鬱成寒中全以養脾為主只
宜理中丸二神交濟丹去百芍
或四物湯去芍藥合理中湯
男精女帶吐瀉奇或暴下

或吐瀉俱發宜古半附湯附子理中湯沈香菴澄丸
遺精金鎖正元丹究源心腎丸硫苓丸崩帶見婦人門腦

寒肢冷心腹痛腦髓寒者三五七散四肢冷者古姜附湯

附湯血虛冷者古茸附湯通身冷昏暈者三建湯順元散
心腹絞痛甚者掇附丸復陽丹挾外感者正氣補虛湯

剛劑慢投恐腎衰金液丹黑錫丹養氣丹返陰丹盡皆金

常服恐水枯火躁元陽脫矣陽臟性急者禁服取陰取陽無過治王冰此語亦吾

師古以三建湯治心經之元陽虛者責其無火也太補陰

者陰陽之氣耳不善調攝偏熱偏寒病未至甚治之不難

若夫積熱始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之

從之不愈則技窮矣由是苦寒頻歲而弗停沈寒始而溫
和次而熱取熱取不愈門因寒而從之從之不愈則技窮
矣由是辛熱比年而弗止殊不知以寒治熱而熱不衰者
由於真水之不足也以熱治寒而寒不衰者由於真火之

不足也。不知水火不足，泛以寒熱藥治，非惟臟腑習熱藥反見化於其病，而有若弗去無者，復至矣。故取之陰，所以益腎水之不足，而制心火之有餘也。取之陽，所以益心火之不足，以勝腎水之有餘也。火之原者，陽氣之根，水之主者，陰氣之根，非謂火為心而原為肝，水為腎而主為肺也。此太僕達至理之妙也。又積熱用苦寒藥，必姜汁酒製，沈寒用熱藥，如附子，必用童便蜜製，蓋寒因熱用，熱因寒用，恐相違逆故也。

右雜病提綱

雜病者，或兼外感風寒暑濕燥火之氣，

或挾內傷宿食氣血痰鬱虛實之情，外感驟則為四中，

內傷久則為沈痼，所以提之於前，以見其為百病大綱，

其餘症皆由此變出，醫能知此門戶，又能知從頭至足，

問症之法，第一辨其為內傷耶，為外感耶，外感乎，昔熱，

而口能知味ク內傷手心熱而口不知味ス外感傷風惡風
面光有汗傷寒惡寒面慘無汗傷暑惡熱煩渴面垢傷
濕惡濕重着面黃內傷勞役傷氣則惡勞而心口不痛ス
飲食傷脾則惡食而心胃刺痛ム若夫色慾傷腎則愈好テ
色而骨蒸口多嗜味ク陰虛火動故也七情思慮傷心ル與
脾則益善思而恍惚不寐憂怒傷肺與肝則愈動氣而
痞滿眩暈口仍失味ク諸氣怫鬱故也一切血症日輕夜
重一切痰症食少肌色如故一切火症性急潮盛一切
水症脇硬心下怔忡テ至於辨症虛實俱以似傷寒陽症

者爲熱且積也似傷寒陰症者爲虛且寒也又辨其內
外有無相兼多寡或不內不外而爲本經自病男子必
審房勞女人先問經孕與所處順逆及曾服某藥然後
證之以脉萬無一失噫機括熟而門類顯者惟不脉而
藥可以廣及然亦難乎其人之妙悟也病家一時緊急
尋醫辨症且將此提綱理會亦不致差門戶以後分類
有言外因風寒暑濕內因七情痰血瘀火食積而不詳
言其症者正以括之於此也以意會之醫門斯可入矣

風類

頭眩

頭眩欲倒辨瘦肥。或云眩暈或云眩冒眩言其黑暈言其
入表而上攻實者內外之邪鬱於上結而下虛大葉肥白
人多濕痰滯於上火起於下痰因火而上衝所謂無痰不
作眩者是也治宜以痰為主兼補氣降火瘦人多腎水虧
少相火上炎而眩暈所謂風勝則地動火得風則焰旋是
也治宜滋陰降火化痰抑肝此以
肥瘦為主亦丹溪常法也後飲此
招尤狗蒙者如以物蒙其首招尤者招搖不定如立舟車
之上其則欲倒眼昏耳聾屋如旋轉甚則卒倒不省人事
乃肝所主也又曰諸脉皆系於目臟腑筋骨氣之精而與
肝并為系上屬於腦後出於項中故邪中於項因達其身
之虛其入深則隨眼系入於腦則
腦轉腦轉則引目系急而眩矣
虛弱老年陽陷越勞役

氣虛不能上升或汗多亡陽宜補中益氣湯色慾傷腎氣
逆不能補元四君子湯加天麻防風或十全大補湯腎氣
丸加鹿茸血虛因產後金瘡及吐衄亡血孤陽浮越古
芍藥湯加炒乾姜寒血滯加重便○老年每早起眩暈
須臾自定有風痰虛火者果係陽虛服元散不黑錫丹必
鎮墜之玉機謂片藥金石助火香竈散氣多致飛越之尤
豈能鎮其不
歸之氣耶
火痰暈迷氣痛眉
火動其痰眩甚者二陳湯
加蒼朮羌活火盛丹

實屬陽明者單大黃酒炒為末茶清下或古劑黃湯加防
風等分屬太陽少陽者酒芍白芷等分為末茶清下或火
半夏白木天麻湯○七情臟氣不平或迷心竅厥
暈眉稜骨痛眼不可開者七氣湯玉液湯補虛飲
風則項

強寒拘痛
外因風脈浮有汗項強熱者川芎茶調散或參
蘇飲加南星黃芩熟地若川芎石羔散虛者山

茱萸散或四物湯加秦艽羌活羌活通痹用卑白芷九又太風頭
眩手足麻痺胃脘發痛乃風寒濕三痺全至必有停飲在
上宜量吐之○寒脉緊無汗四肢拘急筋攣頭刺者
痛五積散喜熱手按者附子理中湯三五七散
暑煩渴

芍藥重

暑熱虛煩渴十味香如散或二陳湯加黃連山
施川芎○濕熱細頭重吐逆芎朮湯芎朮除眩

湯或腎着湯加川
芎風濕玉薤九

外邪和解清痰火內虛本固標自移九

疎益大必眩宜預防之外感解肌化痰不可妄施汗牛內
因量施補益昔丹溪治婦人帶下頭眩專治帶而眩自安
蓋頭眩頭痛咳嗽病之標也經曰治病必求其本○通用
二陳湯七情加丁香砂仁白朮風痰加天麻白附子荆芥
防風寒痰加乾姜良姜熱痰合解毒湯濕痰合三辛湯停
水心忪合五苓散酒食傷加藿生薑胃中宿痰服蠶手麻
痺髮脫健忘者用本方探吐吐後宜服清上辛涼之藥調
之氣虛倍參芪血虛倍芎歸後盛加竹瀝姜汁火盛加重
便如眩暈氣上衝胃戰搖者只宜茯苓桂朮甘草湯加
減○凡眩暈言亂汗多下利時時自暈者虛極不治

頭痛

厥頭痛將內外分

真頭痛引腦巔泥丸盡痛手足冷至節
者死厥者逆也邪氣逆上陽經而作痛

則發厥須分
外感寒熱表家論
外感頭痛必有寒熱宜

立香蘇散消風散風熱川芎石膏散風寒三五散風寒

入腦連齒痛者芎辛湯或羌活黑附湯去附加桂枝

風項背怫鬱腦戶極冷者用麻黃細辛全蝎藿香各五分

為末荆芥煎酒或茶下○寒症連翹葱白湯葛根葱白湯

暑症香薷散加茵陳葱白或大半夏湯姜汁為丸服○

濕症芎辛湯濕熱心煩痛起耳中古防風湯加酒茶蒼木

蒼耳子細辛為末茶清入姜汁少許調服熱多者酒茶為

末茶清下○通用二陳湯加芎芷為主太陽惡風寒暄浮

緊加羌活麻黃川芎陽明自汗發熱惡寒脉浮緩長加升

麻葛根白芷湯者宜合白虎湯加吳黃白芷少陽寒熱往

來脉弦加柴胡黃芩如三陽解肌宿痰痛久不止令人變

明宜合川芎茶調散探吐太陰體重腹痛脉沈必有痰加

蒼木南星少陰寒厥脉沈細加附子細辛厥陰吐沫厥冷

脉浮緩加吳黃頭項背俱痛者宜合羌活湯肥人加二

木瘦人加酒本風熱加蔓荊子川芎酒茶

諸頭痛加細辛黃頂痛加藁本升麻防風
內虛氣滯太陽

痛 內傷氣虛相火上衝耳鳴九竅不利兩太陽穴痛宜補
中益氣湯倍川芎加知母蔓荊子或四君子湯太病後

及諸虛痛者四 血虛魚尾上生瘰 古芎歸湯或四物湯加
桂散加茶一撮 酒芍羌活柴胡蔓荊子

氣血兩虛者調中益氣湯加 腎虛顛痛亡情嘔 腎厥下虛
川芎細辛按火者安神湯 上盛顛頂

痛不可忍脉舉之則弦按之則堅宜玉真丸○亡情氣厥
心腹脹滿嘔吐酸水宜古芎烏散蒴蘆芭散按痰如聖餅

子頭與心換痛 痰火食積皆同因 痰厥頭旋眼黑言亂
者古藁蒼湯 心眼閉股冷宜半夏白

朮天麻湯導痰湯加芎辛三生丸○痰火痛甚如被二陳
湯加芩連或清空膏清上瀉火湯如井實人只宜酒炒太

黃為末茶清下○痰飲滯痛者神芎丸有伏痰者以帶散
生之○積聚痛者太黃備急丸○凡頭痛數日不食百藥

不効者下氣丹無熱者黑錫丹常服黑頭散斷根○尋常
頭目不清似痛非痛參蘇飲主之風熱者微清膏芩連煎

湯調下沐浴後 若卑白芷丸

頭風

附眉稜骨痛

頭風項強分偏正

素有一痰者或櫛沐取涼及醉飽仰卧賊風入腦入項入耳入鼻自頸項已上耳

目口鼻眉稜之間有一處不若吾體皆其漸也亦有頭皮淨頑不自覺者有口舌不知味者或耳聾或目痛或眉稜上

下掣痛或鼻中聞香極香聞臭極臭或只呵欠而作眩冒之狀甚則項強硬身體拘急宜川芎茶調散或祛風通氣

散主之此正頭風也○偏左痛者多血虛或有久或風熱偏右痛者多氣虛或發熱或痰或風濕要知正痛常兼左

右病邪凡頭痛兼濕兼熱陰燮定風濕腫痛連肩背或遇久則為風也陰雨則甚者若治勝濕

湯○風熱頭痛重大遇熱則發消風散倍荆防熱甚二陳湯加荆防薄荷便閉更加大黃微利之熱微二陳湯加酒

芩防風濕痰痛密多右邊濕痰發則痛密無間二陳湯加南星蒼朮川芎及細辛少許

血虛晚重為左病血虛者朝輕夕重古芎歸湯或四物湯加荆防白芷薄荷○若氣虛者朝重

經多屬右邊宜補中益氣湯加芍藥辛。久甚火鬱畏重氣。頭陽虛甚者卑白芷丸用參附煎湯下。發時閉痛必欲絛帛裹包者熱鬱也宜芎藭血濕火為主佐以辛溫散表從治二陳湯加酒炒黃芩及荆芥薄荷川芎石羔細辛或消風百解散防風通聖散。○有三陽熱鬱頭痛不敢見光喜置冰於頂者宜辛寒汗吐下三法併行乃愈。又有偏痛年久便燥目赤眩暈者乃肺乘肝氣鬱血壅而然宜大承氣湯下之外用大黃芒硝為末并底泥調塗兩太陽穴。不妨外感相兼併素患頭風因外感而發者惡寒頭面多汗宜分偏正專治上乃愈。頭風而外感自散如頭風發方愈而後外感自汗者加味烏荊丸因七情發多吐逆寒熱者參蘇飲主之無寒熱者二陳湯加烏藥川芎。眉稜眶痛或羞明無非痰與風熱甚風痰眉心痛者二陳湯吞青州白丸子眉稜骨痛連目不可開晝靜夜劇身重者道遠痰湯濕痰眉眶骨痛體重者芎辛湯合道遠痰湯加川烏白朮寒濕芎辛湯加川烏附子姜桂南星。○風熱眉稜骨痛甚者古防風湯加酒黃芩風虛加川烏草烏細辛或

金棗丹血虛挾風羞明眉聳痛甚者生熟地黃丸或四物湯加羌防氣虛挾風安神湯○通用謝傳點眼丹掩鼻藥

面風

面腫食熱不食

面腫乃食後胃風所致能食者風虛面麻木牙關急搐升麻胃風湯不食者風

熱面唇黑心懸如饑防風通聖散內傷氣促者升麻順氣湯

頰腮同此分重實面腫搭腮

仍以能食為風虛不食為風熱搭頰連齒腫出血者胃火也清胃散搭腮因膏梁積熱者升麻黃連連翹牛蒡子白

芷等分水煎連耳上加羌活耳下加柴胡內虛食少者補中益氣湯耳後微腫者腎虛也腎氣丸料水煎服詳外科

疔陽盛面熱陽衰寒

手足陽明經氣盛則身已前皆熱風熱上衝則面獨熱先以調胃承氣湯

加黃連犀角下兩三行次以升麻葛根湯加黃連川芎荆芥薄荷調之如陽明氣不足則身已前皆寒寒濕上衝則

而反不能耐寒先以附子理中湯數服次以升麻葛根湯去芍加參苓附子益智草薤白芷葱白面浮者補胃湯連

骨痛者 乾姜散 生瘡總是胃家疾

凡風客皮膚 瘡潰膿膿 臟腑則面

腫者俱宜 金沸草散 倍黃芩 或升麻 胃風湯 加減 面上 細瘡常出 黃水 或目生瘡 用桃花陰乾 為末 熟水調服 外 用杏花煎湯洗之 如生五色瘡 只用鹽湯熱浸 搭瘡上 日 五六易 如生粉刺 搗兔絲子汁塗之 內服 樺皮散 〇面皮 裏痛者 用何首烏為末 姜汁調 敷以帛 蓋定 灸熱 鞋底 覺之

眼

眼病須先分表裏

外因風中 腦戶濕漬 頭上熱 遍冷 灌睛 中或久 處州火 或食後向火 或醉後失

枕血滯痰壅 或胃沙塵 或樟刺撲損 湯泡火燒 皆傷目之 標內因 五辛炙燂酒麪濕熱 痰火房室損精勞役 傷氣泣 涕刺頭傷血 暴喜暴怒 暴驚 極目遠視 夜書細字 鑊刻博 索傷神 皆傷目之本 初起在腑 為表 當除風散熱 久則入 臟 為裏 當養血安神 然內因初 入裏 外因久亦帶表 悟之 五輪八廓亦此理 表症多 陽

部分裏在多屬三陰部必更知以肝為主表裏虛實不過五行生尅之理八廓不必深泥舊設七十二症今纂註于

內更不重五輪白肺烏珠肝白屬肺氣之精日氣輪氣症七情氣滯則血凝紅膜薄如

傘紙日久變成白膜者難治○熱症白睛潤濕浮而未腫筋多重者生紅花翳痛澁有淚年深睛變碧色滿目如凝

脂赤路橫直如絲宜四物湯去芍換土當歸加甘草○厚症白睛枯稿氣流而濁○烏珠屬肝筋之精日風輪風症

睛閃兩臉不歸中如轉關難治○熱症赤暈浮聚若烏珠忽然如針刺痛雙目緊急或突出豆許如蟬睛

忌點或生翳似旋螺尖突或周圍生翳如鋸齒如棗花四五枚相合赤色刺痛或生翳四邊皆白中間一點黃心

或生翳如玉色碎痛不痛者忌針割或生青色翳兩目皆痛或翳如冰色堅實傍觀逼透瞳人○虛症輕者枯黃遠

睛重者烏珠上一點圓翳日中見之羞小陰處見之差大或一點黑翳如小豆疼痛淚出者忌點又肝虛雀目曉明

晚暗乃所稟血虛有火也年深則育黃風雀目者木衰土盛終當變黃脹而死宜平胃散以平土氣四物湯以補肝

下

虛經年瞳子色如金者不治。○不治症生翳上橫如劍脊下
面微微甚薄不赤不痛或浮翳如水光白色環遮瞳人
初生自小背頭至烏珠上不痛痒無血色相潮或翳如凝
脂邊厚邊薄形如缺月色光無殺或生翳經年如銀釘釘
入烏珠或因他病生翳

心與小腸內外背

內背屬心外背屬小腸血之精

口血輪熱注輕者赤脉纏背重者赤脉漸漸侵睛或貫頭
結聚生瘡流出膿汁涎水粘睛上下乃風熱留瞼中宜白
薇丸○氣注努肉攀睛或先赤爛多年肝熱所衝或用力
作勞有傷肝氣而成或痛或痒兩皆努出心氣不寧憂思
不已遂乃攀睛或起筋膜宜太黃黃芩
防風薄荷等分入蜜煎服或定心丸

上下兩胞胃與脾

肉之精曰肉輪又上胞瞼內筋皆係足太陽起脉○風症
輕者胞弦緊急重者上下瞼似珠至而生瘡久則生翳乃
風熱也或眼皮有如膠凝腫似桃李時出熱淚乃風毒也
宜點花草膏又爛皮風痒甚雙手背揉日久兩瞼赤爛粒
滯經年不安宜三棱針刺目眦外以燭緹熱內服消風散
桑白皮煎湯調服又倒睫拳毛淚出消消翳膜漸生不愈

年發經年不安眼皮勦急如針刺痛瞳人不安乃脾受風
熱去肉熱退火邪全眼皮緩則毛出翳退外用手法翻
以臉向外以三稜針橫刺用左手爪近其針鋒出血不用
木子搗爛包成條左患塞右右患塞左鼻中其毛自
分先宜瀉肝散後瀉五志散又上下臉俱翻出或一臉翻
出在外乃脾風熱也○熱症輕者臉紅赤硬睛疼淚出羞
明重者兩眼上下初生如粟漸大如米或赤或白不甚疼
痛堅硬乃肝壅瘀血也宜加味荊黃湯又臉内生如鷄冠
塊肉或青或黑阻睛睛痛乃脾血熱也須翻出看之用觀
育草每日輕輕微漸漸括去至生血出用金匙挑洗風
毒藥水按而止之刮後不
時藥水點入則不復腫
腎水一點黑瞳子 腎之精曰水
散大視物不真火盛則瞳人焦黃眼冷則瞳人青綠少
則痛○熱症瞳人內湧者如不患眼人但微有頭旋生
花或勞力轉加昏蒙或頭旋相牽瞳人連鼻隔皆痛時起
紅白或黑花吐逆肝熱則先左肺熱則先右肝肺熱則左
右齊發重則生翳瞳人上加黃脂色滋痛無淚成翳翳如
水銀珠子微含黃色凝結瞳人或散翳形如魚鱗點或收

下起粟子而爛瞳人痛甚又白翳於遠瞳人點點如白花
麟砌皆肝肺相傳風熱也又黑水上橫深瑕盤青色洗洗
深入痛甚乃五臟風熱也或血灌瞳人無翳其痛如刺乃
肝血無歸宜通血丸又瞳人被物撞打驚痛昏暗眼眶停
留瘀血宜貼地黃膏次服決明散如撞刺生翳經久復被
物撞瞳人昏暗者難治經効散救之又飛絲砂塵入眼瞳
人不妄舉瞿麥為末鷲涎調敷或新筆蘸京黑點之又湯
泡火燒腫痛者不可用冷藥即點待一日後以五行湯溫
洗及地黃膏敷之○風症則瞳人青或瞳人連眦頭皆痒
不能收眼乃膽受風熱宜防風一字散○不治症瞳人乾
缺痛流淚或白翳在黑水下向日細視方見或兩眼相
傳疼痛早輕夜重或內障五色相間頭痛無淚日中亦坐
暗室或雷頭風熱毒氣衝入睛
中牽引瞳人或微或大不見

八節寄位始有名

乾為天
癸為地

邊白睛中間屬肺與太陽坎為水癸位瞳子屬腎艮為山
癸位神光屬膽震為雷癸位白睛上截向小腎屬小腸震
為風癸位烏珠瞳人外屬肝離為火癸位大小腎屬心巽
命門坤為地癸位上下臉屬脾胃兌為澤癸位白睛下截

向大背婦人小兒大同耳

婦人活血為主有孕忌用麝香小兒眼患多是胎毒及食毒內

胎敗毒散外洗解毒湯切忌被鐵針灸○小兒初生胎風

雙目紅而垂邊赤爛至三四歲不愈宜消風散桑白皮煎

湯下又小兒通睛欲視東邊則見西畔若按掉頭則睛

方轉此肝受驚風宜牛黃丸又小兒眼胞患瑛瘡熱氣衝

透睛中疼痛淚出翳如銀片腫滿難開宜紫胡散抽醫散

又小兒眼中初生如麻仁日漸如豆懸赤臉內乃風熱攻

脾宜王退散如歲又小兒痘眼初起腫痒久生瘡翳腫痛

乃肝風所衝或初後虛熱上攻者俱足黑宜還睛散痘瘡

眼詳疹痘○小兒不浴在胎中受風五臟不和嘔吐黃汁

兩眼青盲不明及初生視物近看轉睛不快至四五歲瞳

人結白昏暴赤腫痛澁且痒或飲食積熱或天行赤目長

蒙不見暴赤腫痛澁且痒或飲食積熱或天行赤目長

血熱癆瘵則目暴赤腫痛為熱痒為風澁為毒不可驟用

寒藥因成內障亦不可誤用溫藥助熱致令昏澁膠淚努

肉攀睛等狀是成外障決明散主之又有瞽瞍目赤腫皮

久無事者血復散於四肢也宜地黃粥又或讀書針刺過

久無事者血復散於四肢也宜地黃粥又或讀書針刺過

度而痛者名曰肝勞但須閉目調護又中惡崇卒痛
如針刺或如火炙及太陽穴痛早輕夜重宜決明散翳膜
眇眇總是表暴赤後熱流肺經輕則朦朧而巳稍重則生
雲膜如黃膜從下生而上衝黑睛痛澁難開
乃脾受風食毒可治如赤膜從上生下遮覆黑睛名垂簾
膜乃客熱上衝也難治又重則生翳障狀如珍珠碎米紅
色直下而上者易治狀如梅花葉白綠自上而下者難治
治法宜先去翳而後清熱若先去熱則翳難去○眇疾熱
而交流兩眼赤者屬肝熱之甚或衝風淚出由熱甚而水
化制之也又肺受風寒遇風泣則流淚尤甚者白膜翳散
風淚不止食後吞酸歸龍膏丸數粒○目昏者熱鬱也甚
則平白目無所見故傷寒病熱極則目盲而不識人目微
昏者至近則轉難辨物或如翳遮視或視如蠅翅或見黑
花皆目之玄府閉密而致榮衛精神不能升降故也若患
目疾者必多服暗功其風則暗自去○抑論脾家受毒則
眼白赤腫神眇則眼睛亦痛心熱則血灌瞳人傷風則淚
亦出虛煩則眼亦昏勞力則眇亦赤生瘡
乃風熱侵肺黃乃酒傷於脾最宜活變
裏虛昏昧最甚

明上屬肝虛必頭暈目眩耳聾下屬腎虛必眼花睛

痛耳鳴○皆花若傷氣昏暗者傷血熱症亦有羞明怕

日但內虛全內障黑花瞳散杏內障昏蒙外無翳膜因腦

不取近陽光○黑花者腎虛也五色花為腎虛

色或菜豆色或如雲烟或見五色治此外障更難如腦脂

凝結瞳人反背者不治○黑花者腎虛也五色花為腎虛

客熱青花膽虛紅花火盛○近視除虛遠視陽能遠視者

散者首瞳人散大視物昏冥近視除虛遠視陽能遠視者

看一成二屬肝腎虛宜腎氣丸地芝丸或加降火

之劑○能遠視不能近視者屬心虛宜定心丸淚冷睛

疼多縹緲散○睛疼有火者滋腎丸無火者杞苓丸外因

風熱濕挾痰外因風則胞白兩眼拘急牽引瞤斜痒而青

氣飲發雲散白羞翳散防風一字散犀角飲選用○熱則

珠突胞硬腫紅刺痛洗肝散洗心散還睛散通肝散瀉肝

散决明散羚羊角散蔓荊散加味荆黃湯瀉青丸京聘丸

墜翳丸選用○熱則食裁身倦地氣胃明如雲霧掩目或

忽然不見或畧見不明宜益木散單蒼朮膏濕熱甚神悍
号丸○暴寒則目瞶不明皆熱所致也人參敗毒散疼者
升麻葛根湯歷為眼科無寒而有虛豈寒位血而
不上攻耶○按痰者則痛甚宜小省風湯南星丸

血精神少

內傷七情氣壅膨臃胞腫而軟酸澁微赤木香
流氣飲加川号疾黎風與氣搏拜澁渾多痰者

差治石羔故因過思勞神大志丸育神夜光丸因驚恐者
定心丸因怒者當歸龍蒼丸○內傷飲食勞倦損胃氣
火盛血脈沸騰蒼朮聰明湯礞砂丸還睛丸氣弱者車
人參膏補中益氣湯如脾胃熱兼有宿食者秦艽木黃為
末砂糖調服利之脾胃濕傷內外障翳者目丸通本散傷
熱酒胃氣汚濁血死目盲者蘇木煎湯調人參末通鼻與
手掌紫黑者四物湯加桃仁紅花蘇木煎湯調人參末服
○內傷色慾腎氣虛者補腎丸腎精虛者益陰腎氣丸肝
血虛者養肝丸生熟地黃丸肝腎虛者駐景丸○神論五
臟六腑精華皆稟於脾注於目故理脾胃則氣上升而神
清也又肝之系維繫於目而照徹光彩實腎精
心神所主故補精氣安神者乃治眼之本也

風熱兼虛

亦有之

熱久行爲風，冬所乘則眼中不赤而發赤且爛。若風與熱并，則內外浮赤而痒甚。大槩表病肥人多

風，熱防風黃芩湯。火爲君，黃連當歸養血爲臣，柴胡升麻白芷消腫止痛爲使。白睛紅者加白豆蔻少許，瘦人血虛宜因物體膽湯。成加羌活蔓荊荆芥玄參山梔仁菊花爲佐。○意虛肥人多風，虛者防風一字散。四生散補肝，散還睛丸瘦人血虛，按風者通血，左明自地黃丸滋水，地黃丸熱地黃丸。○通用羊肝丸久注者退翳丸活命羊肝丸。

古人只消一火字了

眼不過虛實而已。白輪變赤火乘肺，也肉輪赤腫火乘脾，也黑珠五色花

翳旁虛火也。神光青睛被翳，肝虛火也。赤脈瘀血貫目，熾痛心火自甚也。故童子水在上則視明，老者火在上則視昏。既實火氣有餘，宜前風熱藥中加枳殼杏仁以破氣。虛火血不足宜前養陰藥中加知母黃柏以降火。黑睛有翳者倍之，蓋散有餘之火在於陽衰火少却宜溫。或勞慾破氣降不足之火在於養陰。

赤熱過多以致障身手足麻木九竅不利兩目緊急青白翳見大者視物無力者宜補陽湯黃芪湯或加黃柏或菊

睛九經曰壯水之源以鎮陽也壯火之主以消陰翳養陽是也今人不分陰陽專以龍腦辛香石藥搽點而不加辛散損明悲夫
外治點洗要手巧凡暴赤腫血壅氣凝者一時連點三五次亦可如氣血稍盛者宜服藥以塞其源藥水洗之生有雲膜方可用點若無翳膜終久但可洗之却忌過用涼藥冷洗水血服化爲水至於針刀火烙古人忌用惟太陽經熱生偷針底可刺去血如爛翳用茜草根燒灰燈心草蘸點之須更大痛以百節草刮去他如金針撥轉瞳人等法另是一家傳授

耳

耳聾虛熱分新舊

新聾多熱少陽陽明火多故也宜散風熱開痰鬱之劑舊聾多虛腎常不足故

也宜滋補兼通竅之劑脾症以腎爲主降濡爲虛浮動爲火浮大爲風沉瀉爲氣數實爲熱

兩胃怒左

相火右

厚味動胃火則左右俱聾忿怒動膽火則左耳聾色慾動相火則右耳聾三者忿怒爲多痰火

風濕氣閉可通

痰火因膏梁胃熱上升兩耳蟬鳴熱驚甚則氣閉

木通篇蓄瞿麥因酒者通聖散加南星枳壳大黃或淡茶
九○風聲因風邪入耳必內作痒或兼頭痛風熱或因
者防風通聖散先將大黃酒煨又酒炒三遍後入諸藥俱
用酒炒煎服風壅連頭目不清者清神散風虛者排風湯
桂香飲芎芷散○濕壅因雨水浸漬必內腫痛涼膈散
羌活防風俱用酒炒或五苓散加陳皮枳壳紫蘇生姜湯
痰神等丸濕熱拔氣木香檳榔丸○氣壅因臟氣厥逆上
壅入耳痞塞不通必兼眩暈實人因怒者當歸龍薈丸
人因思者妙香散憂滯者流氣飲子加
菖蒲上盛下虛者秘傳降氣湯加菖蒲
虛聾因久瀉或大病後風邪乘虛入耳與氣相搏嘈嘈而
鳴或時眼見黑花陰虛者四物湯加知柏菖蒲遠志或腎
氣丸加磁石故紙兎絲子黃柏陽虛者八味丸益腎散磁
石湯○勞聾昏昏瞶瞶瘵乏力因勞力脫氣者補中益
氣湯加菖蒲有火者加知柏茯苓因房勞脫精者人參養
榮湯加知柏或補腎脂丸如久聾腎虛氣虛絕不聞者難

治耳鳴乃是聾之漸

惟氣閉多不鳴便聾風熱鳴者解毒湯加生地知母或通聖散痰火鳴甚

當歸龍薈丸按濕神等丸或青木香丸腎虛微鳴滋腎丸氣虛四君子湯下血虛四物湯下陰虛虎潛丸

停膿

疼皆風熱湊

傳耳原有油液風熱搏擊結核鳴欲聾者外用生猪脂地龍銷煉等分姜汁和丸棗核大

餘畏入耳

令潤桃去重者內服柴胡聰耳湯○膿耳風熱

上壅流膿外用枯礬五分陳皮胭脂俱燒灰各二分麝香

釐為末吹耳重者內服犀角飲子○耳疼如虫走者風盛

乾痛者風熱或屬虛火有血水者風濕外用此退燒存性

為末吹入或枯礬末亦可疼甚用吳茱萸頭尖

大要調氣

大黃搗爛含足掌心重者內服東垣鼠粘子湯

與開關

竅腎水竅耳而能聞聲者水生於金也肺主氣一身之氣貫於耳故能聽聲凡治諸聾必先調氣開

鬱間用磁石羊腎丸開竅蓋此皆痰火鬱結非磁石鎮墜

烏桂椒辛菖蒲辛散流通則若痰鬱火何由而開然亦劫

劑也愈後以通

外治果聾亦可透

暴聾用耳聾為丸塞耳內服單甘草湯稍久用

聖散和之可也

松香五錢溶化入巴豆半粒葱汁搗丸綿裹塞耳左聾塞
右聾聾塞左聾聾塞次第塞之○凍耳用攪接燒灰油調搽
如爛貝母末乾糝○百虫入耳用清油灌入口吸氣又自
出如契蚰入耳用信花雄黃各一錢爲末先用一字點耳
中次用猫尿灌之取猫尿以生薑擦牙自出又方用琴瑟
一段將絃頭畧軟二分蘸麝膠入耳粘出凡此不宜厚被
覆塞耳氣久則不通故養
生者常摩耳廓以防聾也

鼻

鼻塞須知問久新

鼻竅於肺而能知香臭者心也人身水

息而已苟或寒傷皮毛則鼻塞不利火鬱清道則香臭不
知新者偶感風寒鼻塞聲重流涕噴嚏宜以風寒治之九
味羌活湯參蘇飲消風百解散又則畧感風寒鼻塞等症
便發乃肺伏火邪鬱甚則喜熱惡寒故畧感冒而內火便
發宜清金降火兼通氣之劑來膈散加荆芥白芷或川芎
石羔散又有不必外感四時鼻塞乾燥不聞香臭宜清金

陽澄茄丸不知香臭者通氣湯內有硬物者卑南星飲貼

顯草撥餅外用石蒲菖皂角等分爲末久成齕齕淵流津

綿包裹塞鼻仰臥片時惡寒者通草丸鼻乃清氣出入之道清氣者胃中生發之氣也鼻塞久則

氣壅不轉熱鬱於腦清濁混亂爲齕爲齕爲淵○齕者鼻流清涕熱微二陳湯加芎歸細辛白芷防風羌活桔梗等

分姜煎入薄荷少許久不止者芷黃散去薄荷加荊芥黃芩神麴南星半夏等分食後煎服外用細辛膏○淵者鼻

流濁涕熱盛金沸草散倍黃芩入鳳凰壳一枚燒存性調服肺風消風散加髮灰肺火流涕咳吐膿血桔梗湯入參

平肺散○膽移熱於腦流涕濁臭防風通聖散加薄荷黃連或芷黃散外用蒼耳根莖苗子燒灰醋調塗鼻內○有

流臭黃水者甚則腦亦作痛俗名腦砂有虫食腦中用絲瓜藤近根五尺燒存性爲末酒調服惡者川烏散外用白

牛尾毛燈葉等分爲末吹鼻中倘有血出如山施亦不妨○齕者鼻流清血鼻淵久則傷酒鼻齕傷熱痛鼻齕難痊頭

紫黑因飲酒血熱入肺復被風寒鬱久則血凝濁而色赤或不飲者乃肺風血熱俱宜四物二陳湯去半夏加紅花黃芩水煎入酒少許調五靈脂末服氣虛加黃芪常宜服卑山拖丸或黃連阿膠丸間用升麻和氣飲香瀉青丸以除病根外用黃連末天吊藤燒灰桐油調敷或硫粉散○鼻痛因風邪入鼻與正氣相搏鼻道不通故痛藿香正氣散祛風通氣散有痰火衝肺者鼻膈隱痛二陳湯加黃芩山拖桔梗麥門冬

鼻瘡鼻痔熱同因

輕為鼻瘡重為鼻痔皆肺熱也鼻中生瘡者枇杷葉煎湯候冷調消風散食後服忌煎炒姜蒜熱物外用辛夷為末入腦麝少許懸塞鼻○鼻痔肺氣熱極日久凝濁結成瘰肉如粟滯塞鼻甚者又名鼻蠅宜防風通聖散加三稜海藻末調服外用辛夷為末細辛杏仁少許為末和羊髓猪脂熬膏候冷入雄黃白礬輕粉麝香少許為丸懸塞塞鼻數日即脫甚者加硃砂少許或瓜蒂散亦妙又食積熱痰生痔者卑蒼耳丸內服外敷最消食積或用白礬二錢細辛一錢白芷五分為末塞鼻

疎風降火真要法

風寒外感者溫以散之風熱有自內鬱者

或外感久則鬱而為熱或內因飲食衣服
過暖肝熱生風亦鼻塞流涕宜降火清金
久宜養血補腎
眞凡鼻涕熱淵久甚不愈者非心血虧則腎水少養血
則血生而火自降補腎則水升而金自清雖鼻齋痔久
亦宜又鼻塞久不愈者必內傷脾胃清氣不能上升
非外感也宜補中益氣湯以和之此皆治本之論

口舌唇

口病有熱亦有虛

心主舌脾主唇口然心勞味厚病根株
心脾二氣恒相通也

心貴安靜七情煩擾過度則心火炎盛加之飲食厚味積
熱而口生瘡或鼻旁心者犀角瑠珀膏心勞味厚者氣出
腥臭唾涕稠黏口乾舌燥瀉白散加桔梗知母麥門
冬黃芩五味子瘰癧熱甚者薄荷煎深者五福化毒丹
偏勝口糜爛熱甚一臟偏勝則口味失常心熱口苦生瘡
東陽散黃連阿膠丸肝熱口酸而苦小柴胡
湯加龍膽草青皮甘草甚者當歸龍薈丸謀慮不决
口苦人參遠志茯苓神甘草為君柴胡龍膽草為使甚者腎

氣左脾熱口甘或臭瀉黃散四順清涼飲并露飲三黃丸
肺熱口辛并枯湯隔白散腎熱口鹹滋腎丸然肝移於肺
則口亦苦木乘脾則口亦酸胃熱或淡或并腎化火則口
而并要之熱勝則苦寒勝則鹹宿食則酸煩燥則澀虛則
淡疸則并勞傷傷肺則口臭口口糜勝就後熱小腸弱澀
虛熱口瘡糜爛者柴胡地骨皮等分水煎服甚若加硝黃
心胃壅熱水穀不化者瀉赤散合四苓散如熱盛并大
便不通臍痛喘急口瘡潰爛者瀉白湯血熱者鷄蘇丸中

虛炎上亦難

中焦不足理中湯甚若加附子下虛甚者

秘傳降氣湯吞黑錫丹二十丸陰虛者四物
湯加知柏或補陰丸年久不愈者黑參丸

外治仍分瘡

赤白

口中瘡赤者心熱用枯礬末糝之或膏良久水漱又
口中瘡白者肺熱用黃柏葶藶等分爲末醋調

搽水漱口中瘡赤白者心肺俱熱用玄胡索一錢黃柏黃

連各五分青黛陀僧各二錢爲末頻搽之或單文蛤末亦

好夏月西瓜水徐徐飲之○虛炎口瘡者甘草乾姜和勻

細嚼嚥之○上熱下寒者黃連乾姜等分噉且服之○口

牙痛瘡用山施去不填白礬入柳葉火中煨烏末吹入口中。口吻生瘡自爛者橫碎燒灰入輕粉少許乾搽。小兒口瘡不食以微感治之必死用白礬煎湯浸脚半日瘡寬更以黃柏姜蜜為末敷之。口瘡疼痛用巴豆半枚生研和米飯一豆大杵和貼印堂對眉間約半刻許覺紅就去不可泡起小兒減半用之。穢氣含香暫

可除。虛火鬱熱蘊於胃中乃作口臭因與前同外。用川芎白芷等分蜜丸含化或香附子亦可。

舌病內外因可詳。心之本脈繫於舌根脾之絡繫於舌兩傍肝之絡循陰氣絡於舌本腎之津液出

於舌端分布五臟心實主。外因強短內腫長。外感風寒傳之故曰諸經皆會於口。經者則舌胎

自白而黃而黑者死。卒中者則舌強而短舌卷不言者死。木槩風用小續命湯寒用理中湯熱用甘桔湯加防風枳

壳黃芩風寒濕舌強者用白礬肉桂末等分安舌下或四卷一葉正舌藥。內因七情氣鬱腫痛不得息者金沸草

散久不愈者黑參在外用古霜並散因怒者單絳鉄粉塗之。舌腫滿口氣不得吐者各木舌用陳茶陳白梅入巴

豆豉同為成膏薄荷水調刷口中得下咽片時即下

二行以粥補佳如生瘡連頰頰腫者玄參升麻湯○舌腫

滿口不能聲飲食不通者各重舌用蒲黃頭刷舌上自退

如不能燕藥即以黃連濃煎時時呷之以瀉心火○舌腫

如摘胞者以針刺舌下兩傍大脉血出即消切勿刺中脉

多血不止設刺以火燒銅筋烙之血再不止者死或醋調

錮煉敷舌上下脫去再敷須臾自消不食者亦死○舌腫

舌下有虫如蛄蟻即蠶頭小白有尾可燒鐵烙烙舌頭上

即消○舌長過寸

者單米片末敷之腎虛色淡黑一二點宜以生薑蜜水洗

肺痰脹或短甘露飲肝衄肝熱舌出如泉心脾裂作

瘡心熱生瘡破裂單黃連煎湯服脾熱舌出乾澀如雪薄

荷蜜米葉在心脾熱者升麻葛根湯加蒲荷黃芩枯梗

唇屬脾家病幾般風瞤動寒揪縮熱裂乾血虛無色氣瘡

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

腫齒唇不食療應難治則死外用青皮燒灰猪脂調搽仍

將青皮灰末每一錢酒調服之。又方用亂髮蜂房不畜
千種灰猪脂調搽或橄欖燒灰或黃柏散。內治實者
黃散虛者菊睛丸
腫者意故仁湯

牙齒

牙齒屬腎胃大腸

牙齒骨屬腎之標也精完則齒堅腎衰

齒上紅止而不動喜寒飲而惡熱飲食手陽明大

腎虛滋陰

腸胃涼

多因飲食色慾過度以致濕熱上攻口湧酸水則
牙床不清而為腫為痛或出血或生虫動搖黑爛

脫落大抵齒動宜速動達者腎元虛也宜滋陰補腎八味
丸三味安腎丸更潛丸惡寒熱而口臭穢者陽胃熱也宜

涼藥瀉火祛

開口便知風與熱

風牙因陽胃原有風邪更
襲外風入齒作痛故開口

風清胃散

受風則痛甚獨活散消風散。風熱因外風與內熱相搏
齒齦腫痛加之膿汁臭者犀角升麻湯或用石膏一兩火

服酒浸防風荆芥細辛白芷各五分為末隨時水煎一二服甚効。○風冷入於齒齦不腫不蛀日漸動搖者溫風散

○熱牙因思胃積熱開口臭穢難近者敗毒散加荆防升

麻石羔或調胃承氣湯蜜丸服如陽胃素積惡熱偶被風

寒冷飲鬱於齒間作痛者當歸龍膽散○虛熱攻衝齦肉

腫痛口舌生瘡宜柴胡北骨皮等分薄荷減平水煎熱漱

冷吐或服之亦好○歷年齒痛黑爛脫落必口咬急稍止

者乃膏梁濕熱之火也調胃承氣湯加黃連下之或用升

麻白芷防風荆芥薄荷枯梗甘草等分水煎服

客寒犯腦痛難當 寒氣犯腦及風邪凌襲腦項筋

痛動搖肉脫者白芷湯羌活黑附湯

挾攻毒痰鑽掣血 痰熱毒氣攻注齒痛者外症咬嚙二陳湯

加細辛枳殼姜棗烏梅仍以姜黃草撥等分煎湯張溫以

舌浸內涎自流出○瘀血因風熱上攻頭面搏血令齒間

血瘀不消鑽刺掣痛并露齦有黑點被虫傷凡飲食不能

飲加升麻或犀角地黃湯

氣淹漬日久兼之風熱上攻齒齦有孔生虫雖一二齒盡又

度其餘至如痔瘻皆其種類必殺虫而後痛止神功丸取

牙痛宜之因只有二

牙縫流血風熱者消風散加芒硝內服外擦腎虛炎者四物湯加升麻或

生肌散皮母黃柏除陰虛火加黃連外敷綠袍散或香薷散常擦變骨鯁風出血骨露者玉

池散痔蟹出血多者用生竹葉二兩醋煮含之定馬痔小兒方散白外治必兼

辛溫藥牙痛本因濕熱被風冷所鬱故內服辛涼以治其本外宜辛溫以治其標通用擦牙方謝傳笑云

散腎虛胃熱方風虫牙疼方經平方劫痛方言齧固齒方消齒齧法取牙不犯手方擦牙先須擦牙

床凡遇日月餘未平時勿進飲食誤食多患齒疾養生一
家晨興叩齒求無齒疾已止五岳井咽候謂之雜科

痛風

痛風歷節分怯勇形怯瘦者多內因血虛有火形肥勇者多外因風濕生痰以其猶歷遍身曰歷

節風甚如虎咬曰白虎風痛多兼腫或不腫痛多痰火腫痛必夜甚若血行於陰也痛多風濕然痰

火雞肉因六慾七情或病後亡津血熱已自沸騰亦必累感外邪而後發動骨節痛極久則手足蹠攣風濕雖外因雖坐濕當風取涼亦必血熱而後凝滯汚濁所以作痛甚則身體羸瘵痰火風濕全者古龍虎丹主之

分上下與週身

傷寒週身節痛乃風寒侵入肌骨雖病週身痛若乃風痰壅滯二陳湯加南星蒼朮

蒼朮白芷酒芍片瀝姜汁或按痰血者加桃仁紅花湯痰瘀血週身兩脇走痛者控涎丹加奔仁泥為丸或小胃丹下之如半身不遂及左右手足蹠攣者烏頭湯微法之風者地仙丹詳中風門○上體痛者宜祛風熱密痰二陳湯主之痰熱客太陽頸項強動則微痛者加酒芍羌活紅花湯痰鑽注肢節痛者加二朮藁靈仙乾姜黃柏羌活白芍桂湯肢腫者倍加黃芩濕熱痰橫行手臂痛加南星蒼朮酒芍香附威靈仙臂重難舉者加二朮羌活桂枝威靈仙黃芩臂軟難舉者加南星枳實木香姜黃如臂痛不能舉或連指掌腫痛者舒筋湯加忍菴小柴胡湯夫手足力防風當歸生地木黃葉連滑石肩背痛因食積者單龜板為丸姜湯下肩腰疼者用龜板下兩側柏葉香附各五錢

白芥子凌霄散各一錢半為末酒調丸以物湯加甘草陳皮煎湯下背心常一片水冷者導痰湯合蘇子降氣湯。

下體痛者宜蒸濕行氣四物湯主之。陰虛腎尖痛者膀胱有火如知母黃柏及桂少許煎酒合二陳湯加澤瀉前胡木香為引痛甚加乳香沒藥熱者合大承氣湯下之兩腿

痛者加牛膝陳皮香加味三妙丸兩腿痛甚素虛性急或痢後血流經絡作痛者加桃仁牛膝陳皮甘草姜汁煎熟調養行散如一兩腿間忽一二點痛入骨不可忍者用羌花

根為末醋調敷痛處以帕緊扎產後有此疾者亦宜兩足痛者當痛拈痛湯。凡痛風丸散佐使在上加羌活威靈

他在下加牛膝防己木通黃柏在手臂加桂枝引至痛處如遍身痛者則問所起處加之風毒髓痛共

一種痛風百節酸疼無定處久則變成風毒痛入骨髓不

移其處虎骨散麝香丸如赤腫灼熱者敗毒散肢節

腫痛挾濕熱者麻黃赤芍湯主之濕痛如脫風汗黃外因濕症腫滿身痛如脫者除濕湯寒濕

蠶附子六物湯提虎骨濕熱者五苓散加蒼朮防風羌活白芷黃柏竹瀝姜汁走注者四妙散肢節腫脹滑者加南

星木香攪樹蒼米黃柏防已。○濕氣背偃僵足癱成痿者，用其遂一錢為末，入猪腰內煨食之上吐下瀉。○風症黃汗出，面微紅，製痛者，防風通聖散或五續命湯去附子，加羌活黃芩，盡若與藥順氣散，獨活寄生湯上體全重，丹下體換腿丸。○風中肩背太陽氣鬱不可回顧，或肺氣鬱熱，小便數而欠伸，宜通氣防風湯羌活勝濕湯。○風濕相搏痛者，餅衣子，左神仙飛步丹龍虎丹活絡丹乳香黑虎丹活血應痛丸。○風濕毒生瘡者，單蒼耳加羌活防風十分之二，為末，蜜丸梧子大，每百丸酒下，或單菴荻荑丸，一斤加四物湯料各五錢，防風羌活各三錢，川烏一錢半，為末，蜜丸，空心茶酒任下。○風寒濕熱成痺，臂解腰脚骨熱腫痛，行步艱難者，二炒蒼柏散等分，加虎脰骨煨半為末，水調服。暑熱煩疼寒掣骨髓。暑濕相搏，面赤尿赤，若五苓散合散。○結陽肢腫熱毒流注，大便閉者，犀角湯。○寒症肢節掣痛，小筋急痺者，五續散合順一元散。○一蠶鶴膝痛者，五續散加松節杉節。○骨髓痛者，虎骨散。七情刺痛食停痰。內因七情肢節骨脇刺痛，初必眩暈。

自汗二陳湯加香附枳壳木香如腰背氣動發痛者枳殼
散疏氣飲子俱加葱白煎服後卧少時如思慮傷心痛從
背起至胃脘者用入參四分木通二分煎湯吞當歸龍薈
丸○飲食積痛風初必胃脘嘔吐二陳湯加烏藥枳壳或
半蒼耳片因食厚味積痰脾胃脾樞左右發痛一點延及
膝胫腫大惡寒夜劇者滑行散為主加甘草稍蒼耳片用
川芎陳皮牛膝木通白芍入姜汁煎服病稍減去犀角加
牛膝龜板歸身尾冬月加桂夏加黃芩又有遍身遊走痒
痛狀如虫嚙遇痒而進飲食則更亦膠飲其間底不致頻
頻嚙也宜麝香丸○留飲四肢麻節氣短脉沉又則令人
骨節蹉跌此為癰瘤宜藥發湯加減痰飲者古半硝凡氣
短倦怠者六君子湯加南星○酒濕痛者用黃柏葶靈仙
各五分蒼朮二錢陳皮芍藥各一錢
錢甘草三分羌活二分水煎服
血氣虛勞不登
養關理
血虛四物湯加龜板秦艽有火者調濟行散有瘀血者加
大黃桃仁紅花微利之性急發熱者加酒本黃柏肢節腫
痛脉澀者加桃仁歷年不愈者倍加木通出汗或發紅肌
即愈若不愈者痛風丸二炒蒼柏散三炒丸○氣虛歷節

痛如錐鐵者四君子湯加桂附白芍○血氣俱虛挾痰火者八物湯加羌活防風黃柏龜板○勞傷者越痛散血風丸切勞散陰虛者鹿潛丸補陰丸

治流濕痺痛

得者初起與傷寒相

似宜分表裏治之表症九味羌活湯氣虛表實骨節痛者六一散加香附黃芩不煎或姜汁糊丸服○裏症五積交加散加大黃痰濕熱者導水丸病愈後大便閉稍虛者麻子仁丸數痛不可忍者用楓寄生焙乾浸酒常服微醉○通用史國公浸酒方萬應膏

調內活血和氣爾

屬內因者宜消痰血養新血兼理痰火則血自

活氣自和痛無不止又不愈者間用升降之劑或專養血補脾如名病及亡血產後病此者俱不宜純用風藥燥血

痺風

附麻木

五痺皮脉肌筋骨

痺者氣閉塞不通流也或痛痒或麻木或手足緩弱與痿相類但痿屬內因血

虛火盛肺焦而成痺屬風寒濕三氣侵入而成然外邪非血虛則不入此所以痺又亦能成痿又痺為中風之一

但純乎中風則陽受之痺兼風寒濕三氣則陰受之所以
為病更重觀宋明醫家仲陽自患周痺偏廢不能全愈可

見上多風濕下寒濕經言春為筋痺夏為脉痺仲夏為肌
肉痺秋為皮痺冬為骨痺言皮脉肌

筋骨各以時而受風寒濕之邪也大藥風濕多侵乎上肩
背麻木手腕硬痛寒濕多侵乎下脚腿木重若上下俱得
身如板拔脚如石墜須分風寒濕多少治之風多痛走不
定寒多掣痛過身拘急手足冷痺與痛風無異濕多浮腫
重着一處不移○風多烏藥順氣散三痺湯起痺湯並補
養丸○寒多五積散加天麻附子或蠲痺湯寒濕五積交
加散○濕多川芎茯苓湯當歸拈痛湯防己黃芪湯羌活
勝濕湯續斷丸○又冷痺身寒不熱腰脚冷即寒痺之
甚者三痺湯合三五七散或舒經湯附子理中湯○又熱
痺或濕生熱或風寒鬱熱身上如鼠走唇口反縱肌肉變
色宣明升麻湯○風寒濕熱痺二妙膏
栝散等分加虎脛骨防風減半水煎服皮頑脉滯症多預
肌肉不仁筋骨屈風寒濕三邪交侵在皮則頑不自覺遇
寒則急遇熱則縱應乎肺其症氣喘煩

滿在脉則血滯六脉縮而緊面無色應乎心其症心煩上
氣益乾善噦噎在肌肉則四肢不仁應乎脾其症怠惰嘔吐
在筋則屈而不伸應乎肝其症夜卧多驚弱澁小腹滿在
骨則重不能舉尻以代踵脊以代頭應乎腎其症心腹脹
滿初入皮膚血脉邪輕易治留連筋骨久而不痛不仁者
難治久久不愈五痺復感三邪入五臟卧不起床渴多食
少亦如中風
入臟者死

祛邪後分氣血痰

初起強硬作痛者宜疎風
豁痰流重者宜流緩行氣

久病須分氣血虛實痰多或少治之○氣虛痺者關節不
充一身如從水中出陽虛陰盛也四君子湯加肉桂生附
或川附九○血虛痺者皮膚不仁濟生防風湯或黃芪建
中湯去飴加桂枝○挾瘀血者四物湯加桃仁紅花竹瀝
姜汁○挾痰者手足麻痺多瞤眩暈濟生茯苓湯或二陳
湯加竹瀝姜汁○腎脂枯涸不行髓少筋弱凍慄癢急者
全大補湯地仙丹○
通用五痺湯擦痺法
補早及令經絡鬱
初病驟用參芪
歸地則氣血滯
而邪鬱經絡不散虛者烏
頭粥行濕氣散主之
麻屬氣虛木痿
此既言之耳
有因虛而風

寒濕三氣乘之麻木併作者有氣血俱虛但麻而不木者
蓋麻猶痺也雖不知痛痺尚覺氣微流行在手多兼風熱
在足多兼寒濕木則非惟不知痛痺氣亦不覺流行常木
為瘀血碍氣間木為濕痰總皆經絡凝滯血脈不貫謂之
不仁或兼濕火則肌肉瞤動不可誤作風治○週身掣痛
麻木者謂之週痺乃用氣不行也宜先汗後補黃芪湯○
開胃麻木暫退閉目甚者并陽和中湯○皮膚麻木者補
氣湯○手足麻木氣虛者補中益氣湯去當歸陳皮加五味
子白芍生甘草濕甚按風者補中益氣湯正料加烏藥附
子羌活防風天麻○十指麻木胃有濕痰死血者二陳湯
加二木紅花桃仁少加附子以行經○左手腳腿偏麻疼
痛右口角併眼牽引側視者表有風也宜天麻黃芪湯○
用腿麻木者氣滯湯○兩
脚麻木如火熱者三妙丸
治同痺風戒酒醋凡味酸傷筋
骨則痿令人發熱變為痛痺麻木等症慎疾者須戒魚腥
蟹酒醋內屬陽助火但可量喫若厚味過多下必虛弱
上必痞悶先用二陳湯加片
藥黃連降火然後用本症藥

八

四三

三

斑疹

附赤白遊風

斑疹屬火有二因

斑屬三焦無根之火疹屬心火其上侵於肺則一也外因初起頭疼身大熱口

知味者忌大汁下宜解肌微汗有自吐瀉者即愈內因或因

或微疼但手心熱脾胃虛者宜大補以降其火體壯者宜清肺必斑勢掀發如錦紋

化其痰斑勢掀發如錦紋有色痕而無頭粒重者紅如錦

誤下心火所主雜病全是風熱挾痰手少陽相火自裏發外治宜安裏藥多發表藥少

升麻葛根湯加玄參咽痛者玄參升麻湯狂言或見血者陽毒升麻湯渴者化斑湯便閉者防風通聖散微利之便

不甚閉去補黃身疼加蒼朮羌活疹嗽加半夏熱甚者黑奴丸斑爛者黑膏內傷發斑輕如蚊迹疹子者多在手足

是初起無頭疼身熱乃胃虛火遊於外宜調中益氣湯黃建中湯內傷發熱上攻頭面者升麻葛根湯加玄參貝母黃芩生地麥門冬內傷疹隱發痒無腫痛疹有頭粒或如

粟米或如蚊虱咬迹微紅或隨出隨沒或沒而又出紅點
隱隱皮膚表分欲出不出但作搔痒全無腫痛名曰癩疹
當春發在傷寒最重即溫毒也升麻湯
根湯加牛蒡子荆芥防風或鼠粘湯
出如粟米赤白分

赤疹因天熱燥氣乘之精氣則消川芎茶調散人參羌活
散胡麻散裏熱者解毒湯白疹因天寒冷氣折之稍暖
則消惺惺散裏虛者理中湯似赤似白微黃隱於肌肉
之間四肢重着此風熱挾濕也多因浴後感風與汗出解
衣而得宜消風散寒加官桂暑加黃芩柴胡濕加蒼朮茯
苓如肢體不仁者黃連湯皮湯通身疹多痛極者古苦皂
凡又有藥疹並出者不可驟用風藥恐變痰嗽滑喘蒼
疹○面生紫赤癰疹及雀子斑汗斑皆此類之緩者

色血毒風火熾

疹色赤者又各丹疹或遍五色因血盛熱
毒蓋於命門被風毒逐動相火則發滿遍

身甚則肌爛寒月升麻湯暑月人參羌活散熱加黃
芩玄參冷加黃芪白芷詳小兒門外治玉珠散寒濕湯

黑而入腹最傷人

凡斑疹赤色身暖白胃腹散四肢者吉
黑色身涼自四肢入腹者死舊分癰疹

丹疹各類今合一
以其因治同也

赤白遊風屬肝火

面皮頸項身體皮肉變色赤者謂之赤

氣不和所生○赤屬血血熱者九味羌活湯加金銀花連翹或四物湯加柴胡山施杜丹皮虛者逍遙散加山施或腎氣丸○白屬氣熱者敗毒散或小柴胡湯加防風連翹虛者補中益氣湯加羌活防風如果係風毒者胡麻散單蒼耳丸單浮萍丸此疾父者只宜滋養氣血則火自息風自定痒自止若用祛風辛苦之劑則肝血愈燥風火愈熾元氣愈虛變為難治

虛痒不止血難為

身上虛痒血不榮於腠理故世宜四物湯加黃芩入紫浮萍未調服或單凌霄花為末酒調服遍身及頭上風屑痒者單苦參丸或薄荷蝉退等分為末酒調服○已上斑癩丹疹癰癤大同小異諸方通用

寒類

咳

咳嗽須分痰與聲痰聲俱有肺脾經

咳因氣動為聲嗽乃血化為痰肺氣動則

咳脾濕動則嗽脾肺俱動則咳嗽俱作

然以肺為主故多言咳則包嗽在其中

聲者聲利痰亦清

咳必先審肺脈虛實實者浮大有力若沉而滑則痰氣盛也虛者弦大無力若

沈細帶數則

外因四氣隨時令

風乘肺咳則鼻塞聲重口乾喉痒語未竟而咳參蘇

火鬱極也

飲加桑白皮杏仁或柴胡半夏湯後用諸咳九如久咳夜

咳冬咳風入肺竅者宜薰之○寒乘肺咳則習緊聲啞二

陳湯加麻黃杏仁或蘇沈九寶飲華蓋散單生薑丸有寒

熱者小柴胡湯又有二種遇寒則咳者謂之寒嗽乃寒包

熱也雖表則除枳梗湯加麻黃防風杏仁陳皮紫蘇木通

黃芩如風寒鬱熱夜咳者三拗湯加知母黃芩○暑乘肺

咳則口燥聲嘶吐沫六一散加辰砂是血者枇杷葉散○

濕乘肺咳則身重骨節煩疼酒洗五苓散不換金正氣散

○大醫春氣上升，胃肺抑肝，夏火上炎，清金降火。秋濕熱甚，結熱瀉濕。冬風寒重，解表行痰。

內傷火鬱

勞食情

久咳聲多痰少，五更咳多者，食積濕熱火流肺中，馮白散加知母，或古二母散，上半午咳多者，胃有

實火，單石羔丸加知母貝母，便閉喘渴痰稠者，承隔散敗毒散，古二母丸下半午咳多者，陰虛四物湯合二陳湯加

知母黃柏麥門冬順而下之，如陰虛火燥寒熱盜汗遺精見血者，四物湯加竹瀝，或滋陰降火湯加味二母丸，黃

咳多者，火浮於肺，潤肺丸以敷之，不可純用涼藥，通用二陳湯去半夏加貝母，以葶青黛山施黃芩桑白皮，○鬱咳

即火咳，又若乾咳無痰，乃腎水焦枯，聚火燭於肺，渴白散加苦梗為君，以開之，又若詞欬九虛若腎氣丸，不得志

者，霞天膏如肺燥皮枯癢痒，便閉者，活血潤燥生津飲○勞咳，五勞傷咳也，疲極傷肝咳，而左脇疼，引小腹者，二陳

湯加尋歸芍藥青皮柴胡草龍膽黃芩竹茹，或茜芪建中湯，芍藥瀉心咳而咽乾咯血者，劫勞散，或天王補心丹

六傷傷脾咳而氣短無力者，調中益氣湯，補中益氣湯，呼傷肺咳而喘吐白沫口燥聲嘶者，潤肺九，不參清肺飲

房勞傷腎咳而腰背痠寒熱者二陳等歸湯又有二種傳
症癆咳即乾咳勞咳久者宜蛤蚧天靈蓋雄黃硃砂之類
須於癆瘵條參之○食咳因食積生痰痰氣衝胃腹滿者
二陳湯加厚朴山查麥芽傷生冷以致肺胃不潔嘔酸牛
瀉惡風寒者五積散理中湯異攻散傷煎炒熱物者葶藶丸
散或三消丸加知母貝母傷酒食積者香附瓜蒌青礬丸
○七情傷氣不平則咳久不已則入六腑怒傷肝咳兩脇
下痛入膽則嘔吐苦汁喜傷心咳心痛咽腫入小腸則咳
與氣俱失思傷脾咳右脇引有背痛甚則不可以動入胃
則嘔吐痰沫長重憂傷肺咳喘息噤血入大腸則遺糞惡
傷腎咳噤延腰背引痛入膀胱則遺尿入三焦則腹滿不
欲食始則關於肺終則聚於胃故也宜二陳湯加瓜蒌仁
蘿蔔子加味湯白散參蘇飲四七湯蘇子降氣湯
圍參飲子古橘井散古橘姜丸加葶三奇湯健胃
痛水咳悸
咳咳痰出咳止胃膈多滿經日秋傷於濕冬必
咳嗽濕在心謂之熱痰濕在肝謂之風痰濕在
肺謂之氣痰濕在腎謂之寒痰惟濕痰入胃上干於肺則
必作支宜十指湯聖痰丸半瓜丸選用痰鬱肺逆咳則延

多或結胸者二陳湯加枳梗瓜蒌黃芩貝母甚者鶴頂丹
痰積流於肺腕久咳不得睡者懸鈴丸痰日久動者二陳
湯加茶連或清氣化痰丸痰因宿食者化痰丸痰因酒濕
者蜂黃丸全因酒者必連丸如痰甚能食便閉者小承氣
湯下之不能食便閉者厚朴湯或痰痰丸陳藥之○水咳
因飲茶水停蓄為涎上湧身熱胃痛怔忡者小青龍湯身
寒脇硬者玄武湯結胸者小半夏湯太便閉
者十棗湯小便澀者五苓散洋傷寒水症

痰血碍氣脹

且腥痰血咳則喉間常有腥氣輕者瀉白散加生地山梔
牡丹皮麥門冬桔梗重者杏仁大黃姜汁為丸服或

因打損勞力傷肺遇風寒則咳或見血紫黑色者四物湯
去芍加大黃蘇木為末酒調服利去心肺間痰血即止後

服人參養榮湯調理○肺脹滿即痰與痰血得氣所以動
則喘急或左或右眠下邊不得者是四物湯加桃仁訶子

青皮竹瀝姜汁若腫脹喘者單人參膏古百花香有冰傳
蓄脹者飲水則逆轉不入三白湯加澤瀉桔梗五倍子若

因火傷極無水以外而脹者必乾咳無痰訶
黎丸含化以訶子有收斂降火之功危哉
治分新久求

其本

新咳有痰者外感隨時解散無痰者便是火熱只宜清之久咳有痰者燥脾化痰無痰者清金降火蓋外

感久則鬱熱內傷久則火炎俱宜開鬱潤燥其間有七情氣逆者則以枳壳香附順氣為先傳水宿食者則以南星

橫梗分消為要氣血虛者補之欬之苟不陷本而浪用規

鈐栗帝滋劑反致纏綿况肺為嬌臟易寒易熱雖人參平

稟惟氣虛最宜若肺熱有火及風邪初盛者

俱宜砂參或玄參代之故咳不拘於寒也

又甚還將脾

腎寧

久咳曾經利下及勞倦饑飽以致肺胃寒而飲食少進者只理脾而咳自止然腎為氣臟咳動引百骸

自覺氣從臍下逆奔而上者乃腎虛氣不歸元宜所服藥

中加補骨脂五味子或三味安腎丸陰虛者腎氣丸陽虛

者黑錫丹以奠之凡咳至

肺脹及咽齶失音者必死

霍亂

霍亂暑濕乾三種

一種暑霍亂即濕霍亂但此疾至秋惟甚縱寒月亦多由伏暑故各一種濕霍

亂有聲有物一種乾霍亂有
病本中焦濕熱壅
標因外感
四氣或日

間感熱夜間受冷或內素鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂
然病本因飲食失節或醉飽酒穀生冷以致濕熱內甚中
焦脾土失運當升不升當降不降是以吐下瀉脈多伏
絕又有挾七情鬱氣痰涎聚胸痞塞不通者外見痰喘眩
暈亦必由傷飲
食為之根也
心腹卒痛或熱寒
先心痛者則先瀉心腹俱痛

者則吐瀉俱作輕則吐瀉而已凡吐瀉時切不可與穀食
雖米湯一呷下咽立死必待吐瀉盡過半日飢甚方可漸
食稀粥○偏陽分則多熱而
渴偏陰分則多寒而不渴
痰喘煩渴却可恐
痰喘二陳
湯加味半

疏九厘煩下既既瀉湯煩渴九君子湯桂苓甘露
飲大渴大燥大汗遺尿者死回生散養正丹救之轉筋舌

卷囊縮危
陽明胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津液驟亡
筋失其所養故輕者兩脚轉筋而已重者遍

體轉筋手足厥冷甚欲絕者倉卒之際宜以鹽填臍中灼
艾不計壯數雖已死而胃中有煖氣者立甦急用木炭散

加小茵苳草蘇葉煎服再研生蒜塗脚掌心雖昏色入腹者亦如如血熱轉筋不已者四物湯加黃芩紅花或蒼木南星水漿不入者古椒土耳散轉筋不佳男子以手挽其陰女子以手牽乳近兩邊如舌卷囊縮轉筋入腹者死分

利升降消食冗

霍亂乃濕熱兼風木為害治宜散風寒利濕降火故四時通用霍香正氣散為散風

寒濕之要藥寒月厥冷脉沈不渴者五積散理中湯古姜附湯暑月煩渴者黃連香茹散冷服俱宜合五苓散以分消上下或更合益元散降火尤效此皆分利法也又當引清氣上升使濁氣自然下降吐瀉未散者宜用二陳湯加芩芷香木防風探吐以提其氣如吐瀉不止宜所服藥中加木瓜橫櫛以降其氣又有可下者但不可純用承藥挾十情者七氣湯古參黃湯傷飲食者紅丸子保和丸俱姜湯送下通用四君子湯有汗加桂枝無汗加厚黃土利轉筋腹痛體重脉沈細加白芍良姜四肢拘急脉沈遲屬少陰加姜附厚朴吐利轉筋脇痛脉弦者木桂王也平胃散加木瓜或小建中湯加柴胡木瓜四肢厥冷脉微緩屬厥陰者小建中湯加當歸附子

心痛

厥心痛先問久新

真心痛因內外邪犯心者一日即死厥

正心之支脉謂之厥者諸痛皆少陰厥陰氣逆上衝又痛

極則發厥也新者身既受寒口又傷冷營過元陽宜草

豆蔻若雞古香散溫散之或神保丸溫利之稍久寒鬱為

熱或因七情者始終是火此古方多以苦寒瀉火為主辛

熱行氣為痛甚發厥有二因寒厥外因風寒客背之血脉

向導也向導也痛甚發厥有二因寒厥外因風寒客背之血脉

逆冷汗甲青似傷寒陰厥古姜附湯三味玄胡散○熱痛
內因酒食積熱痰鬱發厥手足雖冷而身熱甚則煩躁吐
逆額汗古玄金散三味川練散莎苦
散其者太承氣湯下之後服枳朮丸
七情怔忡血不定
悸痛血痛來去痛在痛飲痛食痛風痛冷痛熱痛○悸痛
內因七情輕則怔忡驚悸以痛非痛妙香散四七湯小量
九熱者連附六一湯重則兩目赤黃手足青至節即真痛
不治○血痛濕熱生虫攻心痛發難當痛定能食饑則嘔

赤靈散烏梅

痰火來去症昏神

來去痛肺腎痰火勞心

九化虫凡選用

九痰積白螺壳

痰火來去症昏神

虛者腎經陰氣上攻

神昏卒倒

蘇合香丸痛引背偃傷

沈香降氣湯或五苓散

造桂非汁為丸

小苗煎湯下

素膏者腎火上攻

小承氣湯

癆瘵尸症者此河車丹

脾痛傷飲食腹脹便閉嘔頻頻

胃脘當心而痛脾臟連心而痛局方云即心痛蓋厥

痛亦少脾胃痛多且七情四氣歸脾

而痛攻脾入胃痰

脾胃所主但心痛因傷思慮脾胃痛因傷飲食胃痛善噎

兩脇明膈不利脾痛舌強喜嘔腹脹二便不通古方實痛

以黃連治心

山施治胃脾痛以參歸小草治心丁砂豆蔻

治胃亦未嘗混大藥傷水飲聚涎心痛如刺者溫膽湯加

白木傷食生冷遇熱食暫散者香蘇散加生薑菖蒲半夏

枳壳或人參養胃湯加肉桂吳萸或木香化滯湯感應丸

凡心痛數日不食無妨痛止慾食即發○胃火掩姜飲胃

寒烏藥沈香湯上熱下寒者古施附湯○脾痛海石散古

二胡散風冷抽刀散蟠葱散燒脾散二炒香良散濕者小

胃用壹嘔五膈寬中散腹脹厚朴溫中湯連脇痛後元通
氣散痰滯便閉順氣導痰湯氣聚便閉三和散四磨湯小
便閉通寧散又有心
脾俱痛者手拈散

外感三般風冷熱連脇腰背少舒伸

風因肝邪乘心痛則兩脇引小腹陰股桂枝湯加附子便
閉入蜜一匙同煎或分心氣飲加厚朴枳殼蘿蔔子木香
或阿膠撞氣丸冷因形寒飲冷胃氣乘心痛則心
懸苦饑腰痛下重泄痢五積散便閉加大黃或肺寒乘心
痛則短氣季肋空痛者流氣飲子薑煎散或脾寒乘心痛
則腹脹便難者藿香正氣散按濕者除濕湯熱因心胞
絡暑毒乘心痛微背俞掌熱黃連香薷散加麥草或單黃
連丸凡諸經心痛引背多屬風冷諸腑心痛難以俛仰嘔
瀉多屬熱氣血虛勞按則止虛痛按之暫止素虛多勞或誤服
湯心無血輔者四物湯去地黃加乾姜心氣不足者六君
子湯加肉桂氣血俱虛者古歸木散按痰火食積者二六
九太寶胃高寒飢真實痛素有痰熱頑痰或因惱怒而發
者施黃丸木香檳榔煎湯下或香枝

九、大實痛，因怒後飲食卒痛，注悶，心胃高，起手不可撓，便閉者，大陷胃湯，或者黃芩下之，後服古藁蒼湯以去餘邪。

○瘀血痛，飲湯水，嘔下，作飢，乃素食熱物，血死胃腕，赤仁，承氣湯，輕者四物湯，加赤仁紅花，或玄胡索丸，失笑散。

婦人瘀血入心脾，痛甚者，五積散，加三棱莪朮，經行未盡，血衝心，痛，加桃仁紅花，經行已住，作痛者，七氣湯，加香薷。

產後痛者，桂心湯，本續湯。化痰消積氣已降，痛皆痰積，胃通用二陳湯，風寒初起，無汗，加麻黃。

有汗，加桂枝，裏寒，加草豆蔻，濕，加蒼朮，川芎，熱，加山桅，錫煤，重便，或少，加炒乾姜，反佐之，冷，加丁香，良姜，氣虛，加參

朮，血虛，加當歸，太虛，厥逆，加姜附，肝火，加青黛，青皮，黃連，痰飲，加白螺壳，滑石，南星，食積，加砂仁，香附，瘀血，加韭汁。

桔梗，虫痛，加苦練根，或木香，蠟，急痛，加胡椒，畧用，瓊瑤，炒過，痛不可忍，加細茶，乳香，或石礞石，痛攻走，腰背發厥。

嘔吐，諸藥不效者，加蒼朮，川芎，山桅，探吐，積痰，碗許，乃愈。初痛，六升，可入，寒者九痛。

熱者，散痛丸，通靈散，有積神保丸，瘀血，單乾，容凡，通用手拈散，如意丹，神聖代針散。

腹痛

附：腹中窄狹

腹痛大小分陰陽

大腹痛多食積外邪臍腹痛多積熱痰火小腹痛多瘀血及痰與弱溢臍下卒

大痛人冲黑者中惡客忤不治。○陰症滿腹牽痛自利或嘔喜按少食綿綿不減宜溫之。○陽症腹中覺熱甚則太

便閉瀉脹痛怕按

寒痛綿綿熱不常

怕按以虛痛喜按實痛時痛時止宜下之

深不可太泥經謂寒氣入經客於衛分則血溢急痛按之熱則止寒氣客於榮分則氣滯滿痛甚怕按寒氣客腸胃

募原血絡急引皮痛按之則氣血散而痛止寒氣客腠背

背俞之脉則深按之不能及也寒氣客關元則氣逆噎塞

氣客厥陰脉絡則脇肋與小腹或陰股引痛寒氣客下陽

募原之間則血氣凝聚成積寒氣客小腹不聚則腹痛而

泄寒氣客胃則腹痛而嘔寒氣客五臟則痛死復生治傷

寒腹痛詳三卷四十八葉。○尋常外感胃寒症卒痛吐利

俱酸喜熱物熨者五積散加吳茱萸水煎或藿香正氣

散加木香少許風症桂枝湯加芍藥或胃風湯加水香者

散加木香少許風症桂枝湯加芍藥或胃風湯加水香者

症香茹散加生姜陳壁土紅蓼木瓜或五苓散濕症除濕
湯或香薷散加蒼朮枳壳○積熱時痛時止痛處亦熱手

不可近便閉喜冷宜四順清涼飲
大承氣湯三黃丸老人麻子仁丸
食積有形便後減食積

腸胃作痛得大便秘則裁者宜平胃散加消導藥或保和
丸枳朮丸紅丸子調之或木香檳榔丸大黃備急丸神保

九如意丹下之又有食填胃
滯心胃作痛者宜大吐之
濕痰瀉瀉火鳴腸氣道必小

便不利或二便俱不利宜苦木散如清痰留滯胃腹作聲
若按腹中胃丹小胃丹○痰火痛乃火欲升水欲降相擊腸鳴

者二陳湯加芩連山施如怒火攻衝痛無定處定時者更
加香附芍藥青皮又有糞結腸鳴作痛不大便者大黃備

急丸之類通之如臟寒冷結腸
鳴者宜分三陰以溫藥治之
重痛吐水定能食大青筋

往來絞痛痛定能食發作有時不
止諸痛停裏不散烏梅丸化重丸
七情氣痛吞酸噯氣

胃脘悶或攻注脇背虛者七氣湯木香勻
氣散木香化滯湯實者三和散分心氣飲
中虛金不思飲

食牛虛弱隱隱令痛全不思食者人參養胃湯加肉桂具更木香秦氣虛挾痰者六君子湯加蒼木瘀血

痛必著一方瘀血痛有常處或憂思逆鬱跌撲傷瘀或婦經來產後惡瘀不盡而凝四物湯去地黃

加桃仁大黃紅花○又血虛鬱火燥結阻氣不運而痛者

四物湯倍芍藥加炒乾姜○凡痛多屬血滯通月芍藥甘

草湯為主惡寒初痛屬脾腎加肉桂惡熱而痛屬脾胃加

黃芩脉緩湯水加桂枝脉澁傷血加當歸脉遲傷寒加乾

姜臍下痛加熟地惟氣分諸痛不宜芍藥酸收宜初起

木香橫解青皮陳皮香附辛散之○初痛手拈散

溫實宜虛宜辛溫消散燒脾散蟠葱散丁香脾積丸果

者散之是也○實宜辛寒推蕩經日通

因通用痛隨利減是也方與積熱痛同

腹裏坤久病宜和脾胃如脉弦急木尅土也小建中湯加

當歸取芍藥味酸於土中瀉木為君如脉流細水侮土也

理中湯取乾姜辛熱於土中瀉水為君如脉緩腹痛自利

米穀不化者平胃散加肉桂具更取蒼木苦辛瀉濕土為

君胃氣下陷者加升麻柴胡蒼朮以升之有積者如山查
麥芽枳實黃連木香以消之止熱下寒升降失常腹痛嘔
吐者黃連湯主之○疝痛引氣丸痢痛拘急積聚痛有形
可投湯離痛臍生瘡小便如淋脉沉砂症痛甚嘔吐脉沉
治見腹中窄狹性偏躁無非痰火毒為殃神昏性躁乃濕
各條痰濁氣攻於心脾以致升降失常肥人多濕痰宜下陳湯
加蒼朮燥濕香附行氣瘦人多火宜下陳湯加黃連清熱
蒼朮流濕心神不斂者俱加遠志麥門冬酸棗仁
血氣虛者六君子湯加芎歸養血流濕自然平復

暑類

瘧

瘧疾先要陰陽定

陽為外感邪氣其間陽為風暑有汗陰
為寒濕無汗陰為內傷正氣虛其間陽

為氣虛陰為血虛陽為升發左春夏陰為降發在秋冬陽
為腑邪淺與榮衛並行一日一發陰為臟邪深橫連募原

不能與正氣并行故間日蓄積乃發或三四日一發久則
必有瘧母陽為日發邪從榮衛晝行背與脊故也陰為夜
發邪從榮衛夜行胃與腹故也又有二日連發住三日者
及日夜各一發者乃氣血俱受邪也陽為子時至巳陰為
午時至亥如發寅卯而退於申未或發未申而退於子丑
皆謂之陰陽不分須隨症用藥發早或移時分定陰陽然
後湯瘧截住陰瘧升散今俗以陰瘧誤治變成溫瘧為分
陰陽謬矣殊不知瘧有凌雪之狀在傷寒久則為壞症在
內傷久則為癆瘵豈美疾哉凡陽瘧易治陰瘧難愈陽熱陰寒如期應陽邪與榮爭
外則為熱陰邪與衛爭而正氣退於內則為寒衛虛則先
寒榮虛則先熱表邪多則寒多裏邪多則熱多表裏相半
寒熱相等諸瘧惟食積挾火寒已復熱熱已復寒謂之寒
熱相併又暑瘧卑熱濕瘧卑寒寒瘧先寒後熱風瘧先熱
後寒餘皆先寒後熱陰陽
寒熱相併而瘧治知本矣

寒瘧太陽熱陽明

寒瘧腰背頭
項俱痛屬太

陽寒多熱少汗出難已者柴胡加桂湯卑寒無汗者五積
散古葉附湯熱瘧目痛鼻燥鼓額屬陽明熱多寒少煩

渴尿赤者柴苓湯暑月黃連香薷散熱傷氣分
單熱而渴者白虎加參湯或黃芩湯加桂少許
風癰少陽

寒熱並

風癰口苦嘔吐頭心脇痛屬少陽寒熱相等者柴
胡桂枝湯風盛筋脉抽搐者烏藥順氣散加柴胡

黃芩身疼者敗毒散咳嗽者參蘇飲○已上三陽氣
分受病發在屬暑前著俱謂之暴癰乃傷之淺者
少陰

四正厥四旁

少陰癰發於子午卯酉四正之日舌乾口燥
嘔吐欲閉戶隔輕者小柴胡湯倍半夏重者

公四物湯○厥陰癰發於寅申巳亥四旁之日小腹引
陰如淋輕者小建中湯重者四物湯加玄胡索金鈴子附

太陰辰戌丑未病

太陰癰腹滿自利善嘔嘔已乃寒輕
者異攻散重者理中湯如濕偏陰分

單寒氣壅作泄者古康附湯附子理中湯身重腹脹者五
苓散卡附湯波腫起黃丸○已上三陰血分受病發在裏

暑後者俱謂之溫癰乃隔冬感溫氣藏於腎與骨髓
至夏秋重感新邪觸發自臟而達之腑乃傷之重者瘧瘧

山嵐瘴一方

瘧瘧山嵐瘴毒多人迷困發狂或啞在寒在
熱衣有乍無者涼隔散加柴胡枳實不伏水

土者入參養胃湯。疫瘧一方長幼相似，須參運氣寒熱，用藥大緊，不換金正氣散，五積交加，散加棗加棗，如意用事妙。

鬼瘧卒感異常性

鬼瘧因卒感尸疰客忤寒熱，日作夢寐，不祥多生，恐怖言動異常，宜詳辨丹雄。

硃丹或用燒入場土為。

詳分寒熱汗且和

外感寒多非其，藥厚朴不能溫。

散熱多非柴胡，黃今不能清解。陽瘧無汗，須加柴胡、蒼朮、葛根、甚加麻黃、陰瘧無汗，須加柴胡、升麻、川芎、有汗，須加。

白朮、烏梅，以和之。

或吐或下，須體盛

陽瘧初起，痰在上者，甚邪丸，然亦三五發後移，身乃可用。

之早則延綿稍久，不敢吐者，勝金丹。三陰瘧便閉者，宜下以截之。暑瘧黃連、香茹散，加大黃、青皮、烏梅、煎服。寒瘧示。

二陳湯加青皮、良姜、煎吞神保丸五粒。痰熱胃滿便閉者，大柴胡湯。瘀血發狂，好忘者，飛仁承氣湯。羸弱，麻子仁丸。

俱清，最一服取。

內傷善食性七情

內傷瘧皆不食，惟七情，下惡水即止。善食多汗，五臟之氣不。

和暑被外邪動發，宜四斂飲量。體虛實加各經開鬱行氣之藥。

勞瘧微微虛損症

勞瘧微寒，微惡寒。

發熱寒中有熱熱中有寒最難調理或半月十日小勞復
來經久不癒者芎歸散中散主之熱多者生犀散有瘡者
散中丸。氣虛汗多無力飲食不進者六君子湯因勞役
皆倍少食者補中益氣湯加黃芩半夏。○血虛夜熱者小
柴胡湯合四物湯加升麻紅花知母黃柏水煎露服。○
不愈用勝金丹截之有瘡者陰瘡尤如陰虛火動午後寒
熱至晚微汗乃解似瘧非瘧也宜加味逍遙散加地骨皮
若誤用瘧藥必死。○氣血俱虛弱頭食少或遺精咳嗽者
人參養榮湯加地骨皮烏梅麥門冬或升麻不省者十全
大補湯加柴胡黃芩陽虛去柴芩加附子否黑湯丹有瘡
者橘皮
瘧瘧嘔沫多皆迷
瘧瘧外感內傷鬱聚成瘧熱多
頭疼肉跳吐食嘔沫甚則皆迷
卒爾宜柴陳湯加草薢嘔吐者二陳湯倍白豆蔻流行三
焦嘔瘧自止氣虛嘔者卑人參湯或用常山炒過久不止
者露姜
飲薑之
食瘧腹脹寒熱併
食瘧因飲食編成瘧火寒已復
熱熱已復寒寒熱交併苦饑不
食食則吐瘧胃痛腹脹者二陳湯合小柴胡湯或平胃散
俱加枳實白朮山查神麴青皮寒熱者清脾飲寒多者人

參黃清湯腹痛者紅丸子腹脹因濕痰或瘡氣歸脾者古
籍用世用杏仁煎湯迎發時下久不愈者用辰砂阿魏等

分丸九子大每丁清痰斂汗補胃脾瘡無痰不成內傷
左人參煎湯下截之

濕痰為主內傷瘡皆汗多陽虛斂以參木黃芪陰瘡斂以
扁地知柏芍藥太抵有汗要止汗以補其虛無汗要發汗

以散其邪霜又者下補一發丹久虛補中益氣湯加山查麥芽扶脾自止忌吐截利水消痰瘡母

淨凡瘡經年不瘡謂之老瘡必有痰水瘀血結成瘡塊藏
於腹脇作脹且痛乃瘡母也雖內虛者非常山攢柳決

不能除但須製熟則不損胃老瘡尤是也血虛者驚牛乳
體盛有永瘡者暫用芫花左仍須以補脾化痰湯藥轉之

老瘡飲宜量氣血虛實加減有時瘡後痢相兼或瘡後痢痢後瘡或瘡
和湯清脾飲加減分利願者補脾和血三台湯

加黃連木香當歸砂仁或四散飲補中益氣湯總要祛邪
與扶正

外感汗吐下解祛邪為主內傷斂補養正為主內
外相兼又當參酌抑論經曰夏傷於暑秋必發瘧

又曰諸瘡皆生於風。司方主於傷食。丹溪主於痰。其實因
夏傷暑。秋感風濕。遇七情飲食鬱痰。而後發。雖二因難至
錯亂氣血。然始於暑。成於痰。故揅徑以祛暑消痰為要。
通用二陳湯。外感無汗去茯苓。加柴胡。枳實。芍藥。葛根。蒼朮。
太陽加羌活。防風。藁本。陽明加葛根。升麻。白芷。少陽加柴
胡。黃芩。青皮。心陰加芍藥。黃連。黃柏。太陰加二朮。柴胡。此
三味瘡家必用。厥陰加桂枝。姜附。渴加知母。麥門冬。大便
閉加大黃。杏仁。小便赤加澤瀉。山梔。瞿麥。加檳榔。截瘡加
常山。檳榔。貝母。內傷無汗加柴胡。川芎。氣虛合四君子湯。
血虛合四物湯。汗多加黃芪。食少加山查。麥芽。勞瘡加地
骨皮。驚風七情加藜蘆。香附。痰加南星。姜汁。食積加我木。
久瘡倍參朮。寒甚加桂附。草菓。夜瘡加升麻。柴胡。以提之。
停水倍半夏。夏瘡血加赤芍。仁紅。
○吐瀉不食。腫脹者不治。

痢

痢色症分

身熱口渴。渴溺澀。大便急。痛色赤者為熱。
身涼不渴。溺清。大便順利。色白者為寒。

但病因於暑熱者多寒者少然陰陽變化赤而淡者為寒白而稠者亦熱必色症兩參而後寒熱可辨

濕火氣血滯 血因火動濕多成瀉火傷血分則血瘀從小腸滲下

為赤氣血俱傷則赤白相兼其因有外感暑濕內傷酒醉

生冷硬物積滯或房慾損傷精血而為火之實者有外感寒濕內傷

胃枯益久積成毒經曰飲食不節起居不時者陰受之則入五臟閉塞下為瀉泄腸癰言濕火滯於腸

中故各帶下又云痢者利也法當利下耳

渴嘔 初起發熱惡寒頭疼身痛帶表症也熱者九味羌活湯

極蜜飲惡寒者錢氏白朮散○嘔吐有寒熱者屬表柴胡湯

煩渴多暑者葛根湯六○散上者清六九毒滯上攻者平胃散加黃連木香檳榔○嘔

食少者四君子湯加陳皮厚朴麥門冬竹茹或溫六九日及陰虛者八物湯合二陳湯加枳梗○嘔吐金不食者謂之噤口胃火甚也大虛大熱香連丸加蓮肉各一半

未米飲下又參四錢黃連二錢濃煎終日細細理之如吐再服但一呷下咽便開有甚薰心肺者敗毒散加蓮肉陳米或單蓮肉留心為末每二錢陳皮煎湯下外用大田螺二箇入麝少許搗碎敷臍中以太乙膏貼之引熱下行間有過服利藥及脾胃虛者參苓白朮散去山藥加苜蓿或化或下不化食飭安穢欲出而氣反滯住所以欲便不更腹痛窘迫拘急大腸重而下墜甚則肝門作痛宜木香檳榔通氣大黃降火芩連解毒歸芍和血枳壳陳皮行滯云和血則便自愈行氣則後重自除間有虛火者參不歸苦補之寒疑昔乾姜肉桂溫之又素有積聚偶因一臟之氣發身干犯腸胃成痢者須察何臟相乘以平治之

熱赤紫黑寒白清
偏熱純赤見暑症輕黃赤湯重者煎
滯瀉日久黃連阿膠湯○熱積紫黑色

致瘀血也腹痛後重異常薤白承氣湯下之或因誤瀉以致血瘀者犀角地黄湯加黃連大黃或加味清六九日夕地榆散單苦參丸黃連阿膠丸要知諸菊皆血瘀惟黑為最甚耳○寒痢白芍湯瀉腸鳴痛墜不其不換金正氣散

加烏梅陳米或熟料五積散散肢冷便清古姜附湯中湯
日夕黃連補腸湯○冷熱不調赤白各半古姜墨左或良
瀉仁瀉仁痢非

瀉古黃連左

濕如豆汁風腎是

濕痢腹脹身重下如豆
汁或赤黑混濁危症也

當歸和血散升陽除濕防風湯升陽益胃湯除濕湯猪苓
湯戊巳丸○風痢惡風鼻塞身痛色青或純下清水古
防湯神術散青色帶白者風寒五積散帶紅者胃風湯青綠
雜色屬風火濕及五色俱下者乃脾胃食積及四氣相併
而作古黃連丸救之○已止外感痢疾如一方長如用
者名曰疫痢敗毒散加陳皮或姜茶煎以陽之更益運氣
調七情蟹渤食積黃

氣痢去如蟬渤拘急得甚流氣飲子
古黃連丸六磨湯熱者解毒湯加知

母枳壳或木香檳榔丸冷者木香白氣散黃丸小便開
者五苓散久不止者氣痢丸○積痢色黃或如魚腦聚腹
脹痛惡食者保和丸急痛神保丸一切酒食積聚或黃或
赤通玄二八丹傷酒甚酒蒸黃連丸傷水飲腹脹痛者溫
六九體寶
苦瀉水丸
虛勞滑脫多因備
虛痢困倦食難化腹微痛
或大痛並無努責○血虛淡

紅通玄二八丹日久四物湯加升麻香附創栢葉○房勞

傷精血成毒者腎氣丸虛癆按痢者香連猪肚丸九痢經

下後痛墜不裁虛坐努責及久不愈者皆陰血虛也胃風

湯去桂加熟地主之○氣虛色白如鼻涕凍膠四君子湯

理中湯俱加木香肉桂厚朴茯苓散風邪分水道開胃脫

日久者補中益氣湯虛甚厥逆脈微者四順散黑錫丹○

滑痢不禁甚則脫肛血分四物湯加參朮地榆檮

白皮氣分真人養臟湯太斷下九靈砂蒼榆湯 惟有休

息最難禁 休息痢經年月至瘥有過服藥以致氣血虛

者八物湯加陳皮阿膠苓連少許或十全大補

湯脾胃虛者補中益氣湯參苓白朮散腎虛者四神丸赤

石脂丸有誤服瀉藥餘毒不盡者古苓朮湯神効丸六神

丸有積者通文二八丹積消毒散脾胃已和氣血將復

然後用百中散以止之若更瀉早則纏綿胃敗難救

症如肝不可治 鹽疰痢黑如鷄肝發渴五內切痛乃服三

石湯丸通瀉真陰其血自百脈經絡而來

詩根丸救之亦有宜溫熱藥者○凡痢未如竹筒或如屋

漏水墮腐色氣短飢逆者不治或純下血小便不通唇紅

下後身熱脉弦者俱不治初宜通解或分消通由通用下也然汗吐

者可行若五七日脾胃壅者只宜和解久乃升滋補脾胃

及分利小便消導食積無積不成痢也

稍久以氣血藥中加升麻柴胡防風蒼木以提之久甚及

用栗壳肉豆蔻龍骨牡蠣訶子以澁之飲之食少者專調

脾胃飲食進而氣血自和蓋痢以胃氣為本也其間有重

急甚而無表者即宜通利有壅而不取通者或和緩或即

升舉有氣陷下痢如注者即暫止雖有留滯痛甚者痰火

濕類

痞滿

足腫者有遍身痠節痛者俱餘痰留滯經絡不可純用風

藥鶴膝風大防風湯五積交加散脚細者蒼龜丸詳外科

愈後餘痰却當防三白湯六神丸枳忘成腫痛鶴膝類

本丸太和養選用

痞滿先分便易難

痞與否卦義同精神氣血出入流行之

若脹滿外有脹急之形大要大使易

外感半表同傷寒感

而利者為虛大便難而閉者為實

邪氣自肌表傳至胃腸為半表裏症宜和解或已經

下胃滿而痛者為結胸不痛者為痞滿同傷寒治法

食壅兼養血亡以致中至高之氣乘虛下陷心脾分野

其所蓄之邪又

不設宜理脾胃兼以血藥調之若用氣

藥導利則氣愈降而痞愈甚久則變為中滿鼓脹蓋痞皆

自血中來但傷寒在胃之內宜以苦泄雜病從內之外宜

以平散人徒知氣之不運而驟用枳梗橫擱而不知養

血也哉古方食壅胃中窒塞者二陳湯探吐傷飲食

胃痞者枳朮丸食後感寒以致飲食不化者二陳湯加山

查麥芽神麴溫寒不散或寬或急常喜熱物者

中湯加枳實枳朮及鬱金以散熱者平補枳朮丸

利膈間痰火因厚味痰滯者小陷心湯或枳梗二陳

湯道遠者湯火盛者二陳湯加芩連瓜蒌或黃芩利

利膈間

九用白朮陳皮煎湯下或古更連片以瀉肝補脾清濕
熱開痞結又病者黃連消痞丸如瘵火濕熱太甚者方
用三黃瀉心湯加減量下之虛者只宜分消上十與濕
治七情氣鬱成痞不思飲食食之不散者木香比帶湯
或順氣中虛如刺痞得阻有稟受中虛痞滯不運如饑如
瘵瘵湯微刺者六君子湯加香附砂仁

有內傷勞後發瀉氣犯上清氣下陷虛痞者補中益氣湯
黃連枳實芍藥便閉加大黃瀉加黃連生薑陳皮冬月加
黃連丁香食已心下痞者平補枳木丸停飲中寒者枳實
理中丸○瘵血結成瘵囊而心下痞者用桃仁紅花香附
大黃等分爲末酒調服利之或犀角地黃湯血虛挾火過
勞則發心下不快者四物二陳湯加桔梗承薑降之氣血
俱虛者枳王道消補總可安王道消補不輕吐下故古方
實消痞丸以芩連枳實君臣厚朴生薑

半夏辛散參朮甘苦溫補茯苓澤瀉淡滲隨病所在調之
○通用二陳湯爲主凡人多濕痰加蒼朮砂仁滑石倍茯苓
冬半夏瘦人多鬱熱中焦加枳實黃連乾葛升麻稟受素
實而蒼骨露者加枳壳黃連青皮厚朴素虛者加白朮山

查麥芽陳皮誤下陰虛者去茯苓半夏加參朮升麻
枳實以升胃氣更合四物湯以濟陰血飲食積痞加枳壳
砂仁姜汁炒黃連食後感寒加藿香草豆蔻吳萸砂仁氣
痞痰痞加木香枳壳南星中虛加參朮香附砂仁瘀血合
四物湯加桃仁紅花

五瀉須知ク溺ル

五瀉瀉即濕瀉腸疝即熱瀉鴨瀉即寒瀉
虛瀉滑瀉木要又五瀉熱者小便赤澀瀉

變亦白ハク色身懶動マダガツ作ス日ニ睛メ不レ了ス了ス飲シ食シ不レ下ラ機キ要ス
去暴瀉ハク非ス陽ニ冬瀉ハク非ス陰ニ正ニ如シ傷寒始ハク寒而終ハク熱也ハク濕瀉ハク身ハク

重注

如傾

濕瀉如米傾下腸鳴身重腹不_レ疼_レ外_レ濕者胃苓湯除_レ濕湯或_レ木_レ附_レ湯加_レ茯苓肉_レ濕者白_レ朮芍藥

湯白朮茯苓湯二白丸風濕相搏者蠶矢丸痛甚者治痛瀉方

協風完穀寒急霜

風德惡
風自好

或帶清血即太陰發瀉反其所食原物由春傷風寒夏感
冷濕發動故其瀉暴一方長幼相似不可溫瀉以致變為
痢脹要知四季脾受風濕亦名發瀉春古禁防湯蒼芍湯
夏二香散秋神木散冬不換金正氣散微汗之稍久者三
白湯麴蘖丸帶血虛者胃風湯○寒瀉惡寒身痛腹脹切
痛雷鳴鴨踏清冷完穀不化甚則脾敗肢冷理中湯倍加
茯苓厚朴治中湯加砂仁或太已寒丸又有一種
臘冷瀉以熱手按之則緩者四桂散古禁附湯 身熱煩

渴暑分明

暑瀉如水煩渴尿赤暴瀉實者茹苓湯加黃連
車前子或桂苓甘露飲虛者六和湯清暑益氣

湯有潮熱者柴苓湯升麻葛根湯

日久香連丸黃連阿膠丸來復丹

內傷飲食痛且臭食積痛甚

瀉後痛減臭如抱蟻鷄子噎氣作酸須先消尅所傷之物

傷冷食者感應丸平胃散加香附砂仁草菓山查麥芽傷

熱食及酒者二黃丸加神麴傷酒晨瀉者理中加生薑乾

葛或香茸丸熱者酒蒸黃連丸傷麴者人參養胃湯加藜

藟子傷水飲者

五苓散溫中丸痞脹不順屬七情七情瀉腹常虛痞欲去不去去不通泰藜香正

氣散加丁香砂仁良姜或木香勾氣散
七氣湯古更連丸調其氣而瀉自止矣

痰瀉多少火暴連

痰瀉或瀉不瀉或多或少此因痰流肺中以致大腸不固
二陳湯加白朮神麴實者海青丸瀉者六君子湯○火瀉

實火口渴渴喜冷痛一陣瀉一陣肚門焦痛其來暴連稠粘

五苓散去桂加黃連芍藥或黃芩湯加木通六一散藜蘆

者加姜汁又火性急或米穀不化者姜汁炒黃連為丸服

鹽火氣虛不能飲別水穀者衛生湯陰虛火動不能食

者三白湯飲之

瀉瀉厥汗面多青

瀉瀉困倦無力脾虛飲食即瀉

久者升陽丸

者四君子湯加木香砂仁蓮肉陳糯米為末砂糖湯調服

久者只加升麻白芍或平胃藜蘆丸有傳書飲食數日乃

瀉腹脹者各瀉瀉積木丸沒石子丸煩渴或兼瀉者錢氏

白朮散參苓白朮散食少腸鳴四肢困倦者升陽除濕湯

日止夜瀉者落脾丸又脾瀉久傳腎為陽痿經年不愈者

調中健脾丸又老人脾腎虛瀉者用吳茱萸鹽水浸透以

積猪臟頭一截洗去脂膜將茱萸入內扎兩頭蒸爛搗丸

菴豆大每五十丸米飲下煖腹脫清水道固大腸進飲食

○腎虛色慾所傷瀉多足冷久則肉削五鼓臍下絞痛或只微響瀉瀉一次者古味黃散二神丸四神丸陽虛者三味安腎丸金鎖正元丹養氣丹陰虛者腎氣丸○肝虛忿怒所傷木剋脾土門戶不束厥而面青當歸厚朴湯或熟料五積散去麻黃汗多者黃芪建中湯○凡瀉滑瀉不禁脉細皮寒前後瀉利飲食不入是謂五虛不治

氣陷脫瀉久不止太孔如竹筒直出無禁氣陷者升陽補胃湯補中益氣湯加白芍有風者小白水湯挾熱

者訶子散沒石子丸或古黃連丸罌粟壳煎湯下氣欲脫者真人養臟湯加附子或四桂散太斷下丸古薏附丸香

茸丸婦人四製香附丸又有大交腸似痢何由名者大小

腸滑瀉小使精出者萬全丸便易位而出此因氣不循故道清濁混淆所致當分利陰

陽使氣順各安其位胃寒湯木香白氣散腎氣丸○似痢非痢寒熱不調之症或熱積於中而以冷物冷藥米之或

冷積於中而以熱物熱藥壓之故熱與冷搏而成瀉或瀉或溇重急後重者戊己丸香風宜微發寒溫澁虛補積消

濕滲升凡瀉皆兼濕初宜分理中焦滲利下焦久則升舉

表寒勝必入滲以溫中必入滲以溫中必入滲以溫中必入滲以溫中必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

不可必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入滲則升舉必入

吞酸

吞酸吐酸皆濕熱

經云諸嘔吐皆屬於熱又云少陽之勝嘔酸蓋酸者肝味火盛制金不能平木

則肝木自甚為酸譬之飲食熱則酸但吐酸乃平時津液
上升之氣鬱為痰火留飲不化釀為酸水吐出吞酸乃濕
熱伏於肺胃客不得上嚥不得下宿食鬱遏而作其因治
一也惟濕多則吞而便利熱多則吐而便利東垣言寒者

論其大要初起宜反折素有濕熱因外感風寒則內熱愈

吐胃中無奈或得熱湯暫解蓋風寒鬱在肌表待燄則騰
理開泄譬之傷寒表熱以麻黃熱藥發表而愈不問外感

風寒內傷生冷初起俱宜生薑汁半夏湯或二陳湯加丁
香木香肉桂乾姜砂仁姜棗煎服熱與開豁此反佐之藥

非正治也中病即止如中寒停水者神效丸上痛寒者三
味參黃湯上熱下寒若黃連一兩附子七錢神效丸淡

姜湯久消食積降火痰散熱去則氣自通和所以中酸宜

素食者恐滯氣也○宿食通用二陳湯或生料平胃散加
香附砂仁神效山查麥芽山楂仁黃連或枳朮丸宿食留

飲酸蟄心痛牙齒亦酸者神效木丸專吐清水者用蒼朮茯苓
滑石白朮陳皮水煎服神效難者保和丸○痰火停食

一日半日腐化酸水吐出黃臭或酸心不安通用二陳湯
加山查神變括梗南星枇杷葉黃連竹茹姜煎臨熟入姜
汁一是調服或丸味黃連丸挾痰血者四味更連丸蒸
離者清熱丸○通用太便閉者透膈湯太便自利者用六
一散七兩加吳
黃一兩飯丸服陰虛暮劇須養血朝食甘美至哺心腹刺
四物湯加陳皮黃連黃芩桃仁紅花麻仁甘草
便閉結者更加大黃氣虛者更合四君子湯

黃疸

黃疸須知有濕乾

發黃譬如禽類五疸同歸濕熱蓋濕熱

體俱黃黃即疸也乾黃熱勝色黃而明大便燥結濕黃濕
勝色黃而晦大便潤利又濕病與黃病相似但濕病在表
一身盡痛黃病在裏一身不痛渴多喘滿治之莫日以外人腹喘滿渴多
面黑者死要知疸兼雜症最多脾胃不和汗溺俱黃身體腫
實更斷厚味可治酒色傷欲口腹者難

汗出染衣亦黃身痛者曰黃汗因陽明表熱多汗滯汗入水宜桂枝苦酒湯甚陳湯○小瀉面自牙齦發體如金曰黃疸因暴熱用冷水洗浴熱留胃中故食已善饑安卧懶動宜茵陳三物湯加木通瓜蒌仁石羔或華桃根煎湯服之

頭眩懊懷發赤斑食已頭眩腹脹曰穀疸因胃熱大飽過食停滯胃膈宜小柴胡湯加穀芽

枳實山楂或穀疸丸紅丸子傷冷食脹厥者四逆湯加茵陳○心胃懊懷欲吐不食腹如冰狀足心熱脰滿面發赤

琥珀黃鼻癰曰酒疸因大醉當風入水酒毒留於清道初起今病人先含水後以瓜蒂末一字搐鼻吐出黃水次服

葛水湯探吐亦可熱者小柴胡湯加茵陳白朮豆豉乾葛黃連澤瀉便閉者施玻枳實湯加大黃或酒蒸黃連丸如

酒後犯房瘵熱入心成疸者妙香散痰火入肺甚則額黑成疸咳嗽見血候腥及婦人血崩龍腦雞蘇丸

小腹滿額上黑微汗手足心熱薄暮即發膀胱小便不利日交勞疸因大熱犯房入水腎虛從脾氣上行虛

者四白湯秦艽飲子小兒絲陰經嘔吐陽熱寒諸疸發於子九熱者古醫名散滋腎丸陰經必嘔

小半夏湯發於陽經必有
虛勞口淡脚軟弱內虛發黃口

寒熱小柴胡湯加山柰
淡怔忡耳鳴

脚軟微寒發熱白濁氣虛四君子湯血虛四物湯合四苓

散加茵陳麥門冬氣血俱虛人參養榮湯八味丸如飲食

勞役失節中寒生黃者黃芪建中
外感瘀血詳傷寒行感

湯理中湯食積者二陳湯加砂仁
肩及伏暑發毒未盡蓄熱在內及宿食未消皆能發黃大

要時疫瘧痢發黃瘧瘧九風疔色黃帶青小柴胡湯加茵

陳寒症色黃帶青理中湯加茵陳青皮枳實無汗者用麻

黃三錢酒煎溫服以汗之暑濕症色黃帶赤五苓散加茵

陳最妙○瘰癧發黃者
治分表裏滲濕

狂喜忘便黑詳傷寒
治疳疔表症小柴

少裏多者茵陳五苓散
治分表裏滲濕

三物湯一清飲子和之裏急者首陳湯下之就中尤以滲

利為妙通用五苓散為主濕多倍茵陳食積加三稜我不

砂仁神麴熟加麥連草龍膽小便不利加山柰胃弱合平

胃散去厚朴加茵陳
用涼藥傷胃輕則

黃連山柰防已枳實
用涼藥傷胃輕則

溫中兼補腎與肝
用涼藥傷胃輕則

嘔噦重則喘滿又洒疽下之則成黑疽不渴便利者俱宜
六君子湯加茵陳蒼朮山藥以溫中甚者小溫中丸大溫
中丸退黃丸若虛損猶宜滋補肝腎真陽之精一升而邪
火自斂若必用茵陳強利小便便枯竭肝津腎水則痼病幸
痊而雀目腫
脹又作慎之

水腫

水腫上下陰陽微

陽水多外因涉水冒雨或兼風寒暑氣而見陽症陰水多內因飲水及茶酒過

多或飢飽勞役房慾而見陰症陽水先腫上體肩背手膊手三陽經陰水先腫下體腰腹脛胫足三陰經故男從脚

下腫起女從頭上腫起

者為逆陰陽微妙如此

濕熱變化總屬脾

人身真水真火消北萬物以養

生脾病水流為濕火炎為熱又則濕熱鬱滯經絡盡皆濁腐之氣津液與血亦化為水初起目下微腫如卧蠶及至

水浮腫外則為層脹流下焦則為附腫手按隨手而起如

裹水之狀以指畫之成字者各燥水不成字者各濕水有

拔之作水聲者乃氣虛不能宣泄久成水痕

下注腎經陰附腫

腎主水也惟腎病則不化飲食

滋真水非惟腎精損則熱熱下注陰附獨腫者有之甚則泛溢遍體無歸必土實而後足以收提邪水腎氣歸元

上升氣喘肺孤危

金生水也惟脾病則肺金失養非惟肺氣孤危而失降下之令滲道不通且濕

熱濁氣上升為喘為咳必土實而後肺金清肅以滋化源或曰獨無寒濕者乎寒則土堅水清間有亦更易治

水熱渴二便閉汗下分消要得宜

經曰諸腫疼酸皆由於火又曰絳陽肢腫是

也○治與水在濕在大同太法腰已上腫宜汗腰已下腫宜下表症喘咳小青龙湯裁婢湯古麻并湯桂枝苦酒湯裏症腹腫胸梗十棗湯澤瀉湯澤瀉湯牡蠣湯真水丸三花神效丸潯川丸布海丸然症雖可下又當權其輕重若年衰久病及虛者黃米丸初起只宜上下分消其濕五苓散用桂枝合六一散加橘皮木香檳榔生薑煎服或單山梔丸木香白朮煎湯下兼黃者茵陳五苓散滲之陰水身涼太便利補中行濕或升

提經曰陰蓄於內水氣脹滿是也○治宜補脾土以復運

化之常清心火降肺金俾肝木有制而滲道又且開通

此補中行熱兼全盛而有濕熱者最宜若中寒者溫補則

氣燄而小便自通氣陷者升提則陽舉而陰自降故日行

濕非五苓神祐之謂也○補中氣六君子湯加木香瀉若

參苓白朮散升陽除濕防風湯曬者赤茯苓湯中寒者玄

武湯實脾散飲食積者紫皮九千金養脾丸挾濕熱者中

滿分清湯九濕甚者銀黃丸○虛甚氣陷口無味者六君

子湯加升麻柴胡以提之復元丹切忌淡滲○腎虛腰重

脚腫濕熱者如味八味九滋腎丸陽虛小便不利者古沉

附湯二便俱利者陰多久病或產後久病喘咳痰喘或

木附湯復元丹症也俱宜補脾為主大槩挾喘者分氣紫蘇飲五皮散葶

塵九久痢加味八味九久瘡退黃丸○產後腫必大補氣

血使水自降八物湯加蒼朮陳皮半夏香附有熱加麥門

冬黃芩氣不順加木香砂仁懷胎氣過水道腫者夫半夏

加紫蘇大腹皮飲食無阻陽衰食毒與瘡瘻食積香平丸

者雖不藥而既產自消矣

小蘗湯丸（飲毒水而腫者名水蠱漆毒丸不伏水土為

胃苓湯○腫瘡搽藥愈後發腫敗毒散便閉升麻和氣散

乾蒼洗浴水氣入腹者赤小豆湯瘡久倦怠皆卧腫者三

苓散加橘皮木香檳榔滑石甘草枳壳大腹皮砂仁姜煎

溫風腫走注皮麻水陽水陰水腫外又有風腫氣腫血腫

惟腸蠱石瘕乃婦人病也○風腫即

漏風腫者腫面多風熱腫脾多風濕關脉浮洪弦者風熱

濕三氣鬱而為腫因脾土不足才火太盛胃中結是風氣

所以清氣不升腹作脹脹濁氣不降大便閉澀紅日中滿

瀉之於內者是也外症走注疼痛面皮蠲麻木不仁先服

三和散次服小續命湯大便開去附子加檳榔牽牛日久

者金丹風從汗散故也虛弱不敢汗者四君子湯加升麻

柴胡蒼朮防風汗氣腫隨氣消長之七情停滯鬱為濕熱

多苦防已黃芪湯脾肺俱病四肢瘦削

腹脇膨脹與水氣相似但以手按之或凹不即起者濕也

按之皮厚不成凹者氣也六君子湯加木香木通喘者木

香流氣飲太便閉者三和散六磨湯木香檳榔丸小便閉

者分心氣急喘滿者四炒枳壳九濕者單香附丸挾痰腹

張痛者加味枳

木湯控涎丹

瘀血之腫如何識皮間赤縵血痕兒

四物湯加

桃仁紅花或續斷飲加朱八味丸婦人經閉敗血腫者腎氣丸加紅花或紅鬱丸詳婦人經候

五囊又有

陰陽候

玉莖與陰囊神縮痿強乃身中陰陽之機有陽火玉莖腫脹健裂不休者紫青瀉肝湯濕熱下流者

四苓散加山桅木通金鈴子莖囊腫太通明者木香流氣

飲加木通煎吞青木香丸暴風客熱陰挺腫脹者龍膽瀉

肝湯膀胱熱甚囊腫二便不通者三白散八正散腫痛者

用小茴全蝎穿山甲木香等分爲末每二錢空心酒下有

陰寒濕腫痿弱者五苓散加茴香或八味丸腎大如斗者

荔枝散上熱下虛玉莖腫痛者清心蓮子飲陰腫大如升

枝者用馬鞭草搗爛塗之或乾地龍爲末雞子清調敷囊軟者可治婦人陰腫便秘枳橘散

通治忌甘

與刺皮

凡陽水宜辛寒散結行氣苦寒瀉火燥濕陰水宜

苦溫燥脾或辛熱導氣極忌甘藥助濕作滿尤忌

針刺犯之流水而死○通角二陳湯去甘草加蒼朮白朮

爲君佐以猪苓澤瀉山桅消濕熱麥門冬黃芩爲使清肺

制肝腹脹加厚朴瀉加肉豆蔻訶子喘急加桑白皮杏仁
氣壅加香附食積加山楂麥芽陳水便閉加甘遂少許陰
水氣弱加入參風腫加羌活防風白芷夏月加香薷寒加
姜桂氣腫加蘿蔔子枳壳血加歸芍痰加貝母上腫加紫
蘇下腫加防己木瓜陰囊腫加小茴木香外腎如石引脇
痛加巴戟○又太陽腫症加藁本赤小豆少陽加芫花雄
黃木通陽明加茯苓極日太陰加甘遂葶藶少陰加澤瀉
連翹巴戟厥陰加大戟吳萸此推廣古法不可妄用蓋耳
聾大戟芫花損氣破血巴豆損腎陰氣輕粉傷齒毒留腸
胃土初起奪消而後腫慎之○凡先腫腹而後散於四肢
者可治先腫四肢而後歸於腹者難治若肌肉崩潰足腫
流涎唇黑耳焦缺盆平臍凸背平手足掌平肉硬腹多青
筋大便澀滯者不治又面黑者肝死兩手無紋者心
死臍凸者脾死兩肩凸者肺死下注脚腫者腎死

鼓脹與喘
參看

鼓脹虛軟實則堅

鼓脹中空外堅有似於鼓又曰蠱者若
虫侵蝕之義虛脹陰寒為邪吐利不食

時脹時減按之則陷而軟實脹陽熱為邪身熱咽乾常脹

內痛按之不陷而硬太柔肥人氣虛多寒濕瘦人血虛多

濕都緣脾濕少運布脾居中能升心肺之陽降肝腎之陰

食之精華不能傳布上歸於肺下注膀胱故濁氣在下化

為血痰鬱久為熱熱化或濕濕熱相搏遂成鼓脹或在臍

臍之外或在臍內之旁或在脅脇或在

反膺雖各臟腑見症亦總歸於脾也煩喘嘔瀉腰脇疼

胃痛癰閉小腹墜心脹煩心肝脹脇痛脾脹善嘔噎肺脹

鳴痰吐小腸脹小腹引腰痛膀胱脹小

便癰閉三焦脹氣滿皮膚腫脹口苦外感寒鬱為裏邪

外感風寒傳至陽明裏分太實太痛者承氣湯古云正之

脹已者是也尋常感風脹者升府葛根湯加蒼朮或升

麻胃風湯感寒脹者不換金正氣散加檳榔枳壳乾姜風

寒兩感脹者五積散暑脹二便不利者香薷散加滑石枳

壳黃連二便利者六和湯濕脹腰內傷氣滯閉且利

重或泄者除濕湯瀉者三白湯

氣道升降失常腹脹大而四肢多瘦四七湯七氣湯四妙
枳殼丸因怒傷肝臃脾者痞滿喘急平肝飲子甚者當歸
龍薈丸顯者禹餘糧丸因怒傷肝乘肺傳大腸者腹鳴氣
走有聲二便或閉或澀六君子湯加蘇子太腹皮木香草
菓厚朴枳實便閉者三和散四磨湯憂思氣鬱者木香化
滯湯木香枳木丸溫膽湯退熱清氣湯恐傷腎精氣怯却
不上升而下焦脹者補中
益氣湯加木香檳榔故紙
食脹有熱亦有寒因食肉果菜
不化日食脹

○初起多寒濕自利不食者胃苓湯加山查麥芽或人參
養胃湯加香附砂仁甚者治中湯加丁香或厚朴附子二
味煎服○久則濕熱乘脾大便秘燥者保赤丸傷肉者黃
連阿膠等分醋浸蒸餅為丸或三補丸用香附山查煎湯
下傷雜果者古桂香丸或華陽探吐膏梁厚味大便秘結
太承氣湯加桂或厚朴湯積熱者牽牛丸顯者木香檳榔
丸滋
穀脹痞滿心下因穀食不化日穀脹朝陽盛能食
腎丸
寬中散○濕熱者古黃連丸清瀉蒼朮
丸俱穀芽煎湯下或半雞醴散最妙
中積善治瘕不眠

至精脹腹痛善嘔茶鹽之物千金散雷公丸小兒史君子
九六入厚者木香檳榔丸靈續散化血丸○積塊癥瘕心

腹堅硬咳嗽不眠者廣木續堅湯保

安丸紅丸子輕者枳木丸龜甲丸

水脹瀉血便瘀

水飲茶酒不散日水脹腸中漉之有聲怔忡喘急二時

力括梗橫胸消飲丸酒脹桂苓甘露飲○痰血脹便黑多

跌撲及產後所致人參

亨歸湯散血消腫湯

一般中滿症利輕俗云倒飽有氣

加黃芪厚朴木香食積加山查麥芽被濕熱加黃連青皮

白芍木香清氣陷者木香順氣湯有血虛者四物湯加白

朮木通厚朴被濕熱加苓連有食滯者平胃散加山查麥

芽或枳木丸凡重脹及久病瘧痢脹者俱依此分氣血調

治補中行濕法相并凡脹初起是氣久則成水治此水腫
更難蓋水腫飲食如常鼓脹飲食不

及常病根深固必三五竿而後成治腫惟補中行濕足矣

治脹必補中行濕兼以消積更斷蓋腎音案妄想不責速

效乃可萬全若單腹腫大而四肢極瘦者各嗽蘇靈古方

雖有入物湯去地黃倍參朮加茯苓厚朴及四桂散諸

我

保命丹喉嚨腫肚法然此皆脾氣虛極本經自病更無相
 生相制乃真臟病也不治○補中六君子湯去甘草加大
 腹皮厚朴為君佐以澤瀉利濕黃芩麥門冬制肝朝寬暮
 急為血虛去參合四物湯朝急暮寬為氣虛倍參朮朝暮
 皆急血氣俱虛合八物湯肥人多濕合平胃散瘦人多火
 加香附黃連寒加附子厚朴熱加大黃食脹加砂仁神變
 痰脹倍半夏加檳榔猪苓痰血加桃仁五靈脂積聚堅更
 加三稜義木大蔥加蘆薈山梔氣脹及虫積加木香檳榔
 氣下陷加升麻柴胡凡議下須脉實人盛按之堅者先與
 補藥次畧疏導後又補之否則徒快一時其脹愈甚經云
 臍寒生脹寒脹恒多熱脹恒少○通用中滿分消丸古龍
 虎丹寬中健脾胃為餘藥丸卑鷄醴散內消散外敷神膏

○赤白濁

赤白濁

男
女

皆因

濕熱

脾胃濕熱中焦不清濁氣滲入膀胱為濁如夏月天熱則萬木流津

○赤者血分濕熱甚心與小腸主之導赤散四物二陳湯
 加檳白皮青蘆滑石○白者氣分濕熱微肺與大腸主之

清心蓮子飲或五

積散合四君子湯

濕痰濕火理一

同肥人多濕痰二陳湯

白芍氣虛加參芪

傷暑加澤瀉麥門冬人參傷風加防風

挾寒加姜桂甚加附子

有熱加知母黃柏山梔或星半路

粉丸因七情生痰者

四七湯○瘦人多濕火加味逍遙散

四物湯加知母黃柏

或真珠粉丸權相丸虛挾痰火腎氣

丸補陰丸不可純寒

藥傷血亦不可純儲藥

助火蓋寒則堅凝

熱則流通俱宜清上固下

部

思慮勞心虛者移香散七味溫膽湯金蓮丸房絲傷

腎

虛者華解分清飲小兒絲子丸腎氣丸八味丸心

腎俱虛無火者還少丹

虛冷少久則升提欬胃宮

腹痛不可忍者酒煮當歸丸

久則升提欬胃宮清思亦

傷脾精生於穀故久則宜

升胃補脾二陳湯加升麻柴胡

以升胃氣素有痰火恐升動

痰火胃痛者再加枳壳香附

神麴白朮或用此吐以提之

如平虛勞者補中益氣湯脾濕

不斂者蒼朮難名丹四炒固

鼻丹白朮膏威靈丸久甚古

龍瀉丸石蓮

散遠志丸

熱



